လော်ရာဇ် Lorix ကိုတစ်ခါလိမ်း ဝဲယားနာတွေအကုန်ပြိမ်း



Model Pharma co. Ltd.

ရက်စွဲ - ၁၀.၁၀.၂၀০৭

ဝ ရောဂါ ပကတိ သော ပျောက်ကင်း ပျားသည်. ကတ္တားကို
ကျေးလူး ၀ေးဖို့ပါ ရောဂါးကင်း ပေါ့ကားဖြင့်.

ဝ. ကထောပါ ကိုးခွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ရေ ၊ ယ် သစ်ကင်းကျောင်း ၊
ရေ,မုတ်ဆယ်: ခွဲ.ခွဲ.ဒုတ်၊ မနှုန်း.ပြီ.ကြွင် ထိုင်: ဘိုမ်.ပြ.ခ ခေတ်.ရောက်
ပျောက်ကို ၆ မော ဝိရောဂါ ပြစ်ပျား ခန့ခ မော ကျေးလူး: ဘား ပ၁၁ ဦး ကား ၊
ယစ်ဖေ ပါsion ၊ ကောင် ဖမ်ပ ဆာခံ.ခြို.ဒယ် ၏ ကျ ၊ ခွဲ ပ.ပ.ပ ၊ ပျ.ခ.
Model Pharma Co.Ltd ၌ Lorix ဝဲ၀ေးပြင်. ပေးကား (ဇူလိုင် ၂၀০৭)
ရက်ရှည် ကွင် မာ ရောဂါကို ၆ ခ.ခ.ရောဂါ ပါသည်.

၂. ၆ ခုနှစ်ကျော် ကျော်ခဲ့ကား (၁၀০) ဆောက် ခရီးမှာ ပုံ:၀ ပျောက်
ကင်: ပျားပြီ. ခ ခ.ခ.ပ.ပ.ပ ကျော်ဖို ဆုံ (ကျ.ပ.ခ) ပါသည်. ခရီ.ပြစ်သည်-
ဘရက် Model Pharma Co.Ltd. ခေါ်: ခ ထုတ်.ပင် ကော်.ရ.ခ.ခ ကို
ပါ ပြောင်: ကောင်ပြ ကယ်ပါ သည်.

(ဦးခင်ကျော်)
ဒေတာစီးတိုင်ကြီး
လူထုကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ
Ph. 02. 60476

ဝေး။ ။ ဝဲယားနာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ?

ဖြေ။ ။ ဝဲယားနာဟာ ဝဲပိုးလို့ခေါ်တဲ့ ခြေရှစ်ချောင်းရှိတဲ့ ကပ်ပါးမျှားပိုးကောင်ငယ်ကလေးများကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်းဆက်ပိုးကောင်ငယ်များမှာ ခြေရှစ်ချောင်းပဲရှိပါတယ်။ ဝဲပိုးများကို သာမာန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ဘဲ အကာကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဝဲပိုးမှာ အပ်ဖျားထိပ်မျှ ငယ်ပြီး ၁ မီလီမီတာရဲ့ ၃ ပုံတစ်ပုံ ထိရည်လျားပြီး ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားအောက်မှ ကတုပ်ကျင်းသဖွယ် တူးဖြောင်း ကလေးများ ပြုလုပ်တွယ်ကပ်နေထိုင်တတ်ပါသည်။ ကပ်ရောဂါသဖွယ် လူလူချင်း အလွယ်တကူ ကူးစက်ပြန့်ပွားလွယ်ပါတယ်။ ထိရောက်စွာကုသခြင်းမရှိပါက တစ်မိသားစုလုံးမှသည် တစ်ရွာလုံးသို့ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ကူးစက်ပြန့်နှံ့တတ်ပါသည်။



ဝေး။ ။ ညဘိုင်းမှာ ဘာကြောင့်ပိုယားတတ်တာပါလဲ?

ဖြေ။ ။ အိပ်ရိုန်တွင် လူခန္ဓာကိုယ်နွေးထွေးမှုကြောင့် ဝဲပိုးမှာ အရေပြားပေါ်သို့တွက်လာပြီး ဝဲပိုးအထီးနှင့် ဝဲပိုးအမမှာ မိတ်လိုက်ပြီး နှစ်ပါတ်အတွင်းမှာ ဝဲပိုးအကောင်နှစ်ဆယ်မှ နှစ်ဆယ့်ငါးအထိ မျိုးပွားတတ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ ခန္ဓာကိုယ်မှ စွန့်ထုတ်ပြစ်သည့် အညစ်အကြေးများကြောင့် အရေပြားများပေါက်ပြဲကာ အခြားရောဂါပိုးများဝင်ပြီး အနာများ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။

ဝဲပိုးကူးစက်ပြီး နှစ်ပါတ်အတွင်းမှာ အိပ်မရနိုင်လောက်အောင် ယားယံကာ အခြေအနေဆိုးဝါးလာတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် A.I.D.S ဝေဒနာရှင်များအား ဝဲပိုးပိုမိုကူးစက်ပြန့်ပွားမြန်ပြီး Norwegian Scabies ဟု ခေါ်သော ဝဲယားနာ ဂျတ်ထုတ် ကြီးဖြစ်ကာ အိပ်ရေးပျက်အားနည်းခြင်း မဖြစ်မီ ထိရောက်သော ဆေးဝါးများဖြင့် ကုသရန်လိုအပ်ပါမည်။

ဝေး။ ။ ဝဲယားနာပိုးဘယ်လိုကူးစက်တတ်ပါသလဲ?

ဖြေ။ ။ ဝဲပိုးမှာ လူခန္ဓာကိုယ်ချင်း ထိမိချင်းမှုရင်း၊ မျက်နာသုတ်ပုဝါ၊ လက်သုတ်ပုဝါ၊ အိပ်ယာခင်း၊ ထိုင်ခုံများမှ တဆင့် လွယ်လင့်တကူ ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်ပါသည်။ ကူးစက်မိပါက လက်ချောင်းများကြား၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ တံတောင်ဆစ်၊ အဂေါက်ကွေး၊ မျိုးပွားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများတွင် ပန်းရောင်အစက်လေးများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။

ဝေး။ ။ ဝဲရောဂါပိုးကိုဘယ်လိုထိရောက်စွာနှိမ်နင်းရမလဲ?

ဖြေ။ ။ သမားရိုးကျ ဝဲကုထုံးများဖြစ်သော Benzyl benzoate, Crotamiton 10%, Lindaine 1% ကဲ့သို့ လိမ်းဆေးများသည် အာရုံကြောများ အဆိပ်သင့်ခြင်း (Neuro-toxicity) ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြောင့် ကလေးသူငယ်များနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ မလိမ်းနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် ထိုဆေးများသည် ဝဲပိုးကိုသာ နှိမ်နင်းနိုင်ပြီး ဝဉများကို မနှိမ်နင်းနိုင်သဖြင့် ဝဲပိုး အကင်းမသေကာ ဝဲသံသရာလည်နေတတ်ပါသည်။

Permethrin 5% ပါဝင်သော **Lorix** (လော်ရာဇ်) လိမ်းဆေးမှာ ဝဲပိုးကိုသာမက ဝဲပိုး၏ ဥများနှင့် အကောင်ပေါက်ငယ်များကိုပါ တစ်ခါလိမ်းရုံဖြင့် အကင်းပြတ်အောင် နှိမ်နင်းနိုင်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိသည့်အတွက် အမေရိကန်ဗဟိုရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန (US - CDC) က သုံးလအထက် မွေးကင်းစကလေးငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များပါမကျန် အသက်အရွယ်မရွေး လူတိုင်းလိမ်းနိုင်ကြောင်း ဝဲရောဂါနှိမ်နင်းရေးအတွက် ပထမ ဦးစား ဝေး (First- Line Therapy) အဖြစ် ၂၀০၂ ဇန်နဝါရီ-၂၃ရက်နေ့တွင် တိုက်တွန်းကြေငြာထား ပါသည်။

ထို့အပြင် ပုံတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Norwegian Scabies အားကုသရာတွင် **Lorix** (လော်ရာဇ်)မှာ တစ်ခါလိမ်းရုံဖြင့် သိသာစွာ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။

၂၀০၈ ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ်၊ ဗြိတိသျှဆေးစွယ်စုံကျမ်း (British National Formulatory) စာမျက်နှာ ၆၃၄ တွင် Permethrin 5% ပါဝင်သော လိမ်းဆေးအား ဝဲရောဂါကုထုံးအဖြစ် ဦးစားပေးဖော်ပြထားပါသည်။

ဝေး။ ။ လော်ရာဇ် **Lorix** ကိုဘယ်လိုလိမ်းရသလဲ?

ဖြေ။ ။ မျက်လုံးနှင့်ပါးစပ်ကိုချန်လှပ်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြား အရေပြားထဲစိမ့်ဝင်သွားတဲ့အထိ လိမ်းပေးရန်လိုပါသည်။ သုံးလအထက် ကလေးငယ်များတွင် လိမ်းလျှင် ဆေးလိမ်းထားသော ကလေးလက် ပါးစပ်ထဲမဝင်စေရန် အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။

ဆေးလိမ်းပြီး (၈) နာရီအတွင်း ရေ(လုံးဝ) မထိရပါ။ ရေထိမိပါက ထိုနေရာအား ဆေးပြန်လိမ်းရန်လိုပါလိမ့်မည်။ ဝဲပိုးငယ်များမှာ အင်မတန် ပါးနှပ်လျှင်မြန်ပြီး ရေချိုးစဉ် အတွင်း အရေပြားအောက်အတွင်းရှိ ၎င်းတို့၏ ကတုပ်ကျင်းငယ်များအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပုန်းခိုနေတတ်ပြီး ရေချိုးပြီး အချိန်အတော်ကြာသည်အထိ ပြန်ထွက်လာလေ့မရှိသဖြင့် ရေချိုးပြီးပြီးချင်းမလိမ်းဘဲ အနည်းဆုံး (၃) နာရီခြားပြီး ခြောက်သွေ့သောအရေပြားပေါ်တွင်သာ လိမ်းသင့်ပါသည်။ တစ်မိသားစုလုံး တပြိုင်နက်တည်း ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးလိမ်းလျှင် ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။

ဆေးလိုက်ပြီးနောက် ဝတ်ထားသော ဝတ်စုံ၊ ခေါင်းစွပ်၊ ခြေအိတ်၊ ကုတင်ခင်း၊ ခေါင်းအုံး၊ ပုဝါ၊ ဘီးလိုက်၊ ဘီးပတ်ကို ရေပူ(၆၀ဒီဂရီ)ဖြင့် ဆေးကြောပြီး နေပူတွင် ခြောက်အောင်လှန်းပြီးမှ ပြန်သုံးရန်လိုပါသည်။

ကလေးငယ်များ ကစားကွင်းနှင့် ကျောင်းများ ကဲ့သို့ ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့ရာနေရာများ ရောက်ရှိခဲ့ပါက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကာကွယ်ရန် ဝတ်ဆင်ထားသော ဝတ်စုံ၊ ခေါင်းစွပ်၊ ခြေအိတ်ကို ပြန်ချွတ်ပြီး ရေပူ(၆၀ဒီဂရီ)ဖြင့် ဆေးကြောပြီးမှ ပြန်ဝတ်ဆင်