

Trilock®

Montelukast

Description: Montelukast (Trilock®) is a selective and orally active leukotriene receptor antagonist that blocks the cysteinyl leukotriene₁ receptor.

Mode of action: The cysteinyl leukotriens (LTC₄, LTD₄, LTE₄) are products of arachidonic acid metabolism and are released from mast cells and eosinophils. These eicosanoids bind to cysteinyl leukotriens receptors (CysLT₁) found in human airway that are responsible in pathophysiology of asthma and other inflammatory process. Montelukast is a leukotriene receptor antagonist that inhibits the cysteinyl leukotriene₁ (CysLT₁) receptor.

Composition: Trilock® 4 mg OFT: Each oroflash tablet contains Montelukast Sodium USP 4.16 mg equivalent to Montelukast 4 mg.

Trilock® 5 mg OFT: Each oroflash tablet contains Montelukast Sodium USP 5.20 mg equivalent to Montelukast 5 mg.

Trilock® 4 mg Chewable Tablet: Each chewable tablet contains Montelukast Sodium USP 4.16 mg equivalent to Montelukast 4 mg.

Trilock® 5 mg Chewable Tablet: Each chewable tablet contains Montelukast Sodium USP 5.20 mg equivalent to Montelukast 5 mg.

Trilock® 10 mg Tablet: Each tablet contains Montelukast Sodium USP 10.40 mg equivalent to Montelukast 10 mg.

Trilock® 4 mg Oral Granules: Each sachet contains Montelukast sodium USP 4.15 mg equivalent to Montelukast 4 mg.

Indications: Montelukast (Trilock®) is indicated for the prophylaxis and chronic treatment of asthma in adults and pediatric patients. It is also indicated for the relief of symptoms of allergic rhinitis.

Dosage & administration: Adults (15 years of age or over): 10 mg daily to be taken in the evening.

Children (6-14 years of age): 5 mg daily to be taken in the evening.

Children (6 months-5 years of age): 4 mg daily to be taken in the evening.

Contraindications: Montelukast is contraindicated to patients with hypersensitivity to any component of this product.

Side effects: Generally, Montelukast is well-tolerated. Side effects include dizziness, headache, diarrhea, restlessness, abdominal pain, fever, asthenia and rash.

Use in pregnancy & lactation: Pregnancy: US-FDA approved pregnancy category B.

Lactation: It is not known whether Montelukast is excreted in human milk. Caution should be exercised when Montelukast is given to a nursing mother.

Precautions: Montelukast is not indicated for use in the reversal of bronchospasm in acute asthma attacks (in case of status asthmaticus). Patients with known aspirin sensitivity should continue avoidance of aspirin or other NSAID, while taking Montelukast.

Drug interactions: Generally montelukast doesn't causes drug interactions with other medications but clinical observation is important when co-administered with Phenobarbital and Rifampicin.

Over dosage: There were no adverse experiences reported in the majority of overdosage reports. The frequent adverse experiences observed were thirst, mydriasis, hyperkinesias and abdominal pain, in the event of overdose, it is reasonable to employ the usual supportive measures e.g., remove unabsorbed material from the gastrointestinal tract, employ clinical monitoring, and institute supportive therapy, if required.

Storage: Keep out of the reach of children. Store in a dry place, below 25°C temperature and protected from light.

Packaging: Trilock® 4 OFT: Each carton contains 14X3 tablets in Alu-Alu blister.

Trilock® 5 OFT: Each carton contains 14X3 tablets in Alu-Alu blister.

Trilock® 4 Chewable Tablet: Each carton contains 14X3 tablets in Alu-Alu blister.

Trilock® 5 Chewable Tablet: Each carton contains 14X3 tablets in Alu-Alu blister.

Trilock® 10 Tablet: Each carton contains 14X3 tablets in Alu-Alu blister.

Trilock® 4 Oral Granules: Each carton contains 1X10 sachets.

ট্রাইলক®

মন্টিলুকাস্ট

বিবরণ: মন্টিলুকাস্ট (ট্রাইলক®) একটি সিলেক্টিভ এবং ওরালি সক্রিয় লিউকোট্রাইন রিসেপ্টর এক্টিভেটিং যা সিস্টেনাইল লিউকোট্রাইন১ রিসেপ্টরকে ব্লক করে।

কার্যপদ্ধতি: আরাকিলোনিক এসিডের বিপাকীয় ক্রিয়ায় মাস্ট কোষ ও ইওসিনোফিল হতে সিস্টেনাইল লিউকোট্রাইন (LTC₄, LTD₄, LTE₄) তৈরি হয়। এই ইকোসাইনেট মানব ধৰ্মকালীর সিস্টেনাইল লিউকোট্রাইন রিসেপ্টর এর সাথে আবদ্ধ হয়ে হাঁপানী এবং অন্যান্য প্রদাহজনিত উপসর্গ তৈরি করে। মন্টিলুকাস্ট হলো লিউকোট্রাইন রিসেপ্টর এক্টিভেটিং যা সিস্টেনাইল লিউকোট্রাইন১ (CysLT₁) রিসেপ্টরকে ব্লক করে।

উপাদান: ট্রাইলক® 8 মিশ্রা ওএফটি: প্রতিটি ওএফটি ট্যাবলেটে আছে মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম ইউএসপি 8.16 মিশ্রা যা মন্টিলুকাস্ট 8 মিশ্রা-এর সমতুল্য।

ট্রাইলক® 5 মিশ্রা ওএফটি: প্রতিটি ওএফটি ট্যাবলেটে আছে মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম ইউএসপি 5.20 মিশ্রা যা মন্টিলুকাস্ট 5 মিশ্রা-এর সমতুল্য।

ট্রাইলক® 4 মিশ্রা চায়ে খাওয়ার ট্যাবলেট: প্রতিটি চায়ে খাওয়ার ট্যাবলেটে আছে মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম ইউএসপি 8.16 মিশ্রা যা মন্টিলুকাস্ট 8 মিশ্রা-এর সমতুল্য।

ট্রাইলক® 5 মিশ্রা চায়ে খাওয়ার ট্যাবলেট: প্রতিটি চায়ে খাওয়ার ট্যাবলেটে আছে মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম ইউএসপি 5.20 মিশ্রা যা মন্টিলুকাস্ট 5 মিশ্রা-এর সমতুল্য।

ট্রাইলক® 10 মিশ্রা ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম ইউএসপি 10.80 মিশ্রা যা মন্টিলুকাস্ট 10 মিশ্রা-এর সমতুল্য।

ট্রাইলক® 8 মিশ্রা ওরাল গ্লাউটিলস: প্রতি ট্যাবলেটে আছে মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম ইউএসপি 8.15 মিশ্রা যা মন্টিলুকাস্ট 8 মিশ্রা-এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: মন্টিলুকাস্ট (ট্রাইলক®) সাধারণত প্রাপ্তব্যক এবং শিশু নেওন্দের ক্ষেত্রে প্রতিবেদক এবং দীর্ঘকালীন হাঁপানী রোগ চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগ: প্রাপ্ত বয়স (বয়স 15 বছর বা তার বেশি): দৈনিক 10 মিশ্রা সমতুল্য।

শিশু (৬-১৪ বছর বয়স): দৈনিক 5 মিশ্রা সমতুল্য।

শিশু (৫ মাস থেকে ৫ বছর বয়স): দৈনিক 8 মিশ্রা সক্রান্ত।

ব্রিক্স ব্যবহার (যেকে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): মন্টিলুকাস্ট অথবা এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: মন্টিলুকাস্ট সাধারণত সহস্রনীয়। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, ভায়ারিয়া, অস্থিরতা, পেট ব্যথা, জ্বর, দুর্বলতা এবং ফুসফুড়ি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থা: US-FDA নির্ধারিত প্রেগন্যাস্পি ক্যাটগরী B।

স্তন্যদানকালে ব্যবহার: মন্টিলুকাস্ট মন্ডুরুর সাথে নিঃস্তুত হয় কিনা তা জানা যায়নি। সর্তৰ্কার সাথে সদ্যজাত শিশুর মাকে মন্টিলুকাস্ট দেওয়া যেতে পারে।

সতর্কতা: মন্টিলুকাস্ট উত্তর হাঁপানীর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত নয়। এসপিরিন সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে যখন মন্টিলুকাস্ট গ্রহণ করা হয় তখন এসপিরিন বা অ্যান্টি-NSAIDs ব্যবহার করা যাবে উচিত।

অন্য ওয়ার্ধে সাথে প্রতিক্রিয়া: মন্টিলুকাস্ট সাধারণত অন্য ওয়ার্ধের সাথে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না তবে ফেনোবারিলিটাল ও রিফামপিসিন-এর সাথে মন্টিলুকাস্ট সেবন করা হলে যথাযথ ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণ যুক্তিমূল্য।

মাত্রাবিক্রিয়া: মাত্রাবিক্রিয়ে তেমন কোন বিকল প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। পরিলক্ষিত ব্রিক্স প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ছিল তৃষ্ণা, মিল্ড্রেসিস, হাইপার-কাইনেসিয়াম এবং পেট ব্যথা। মাত্রাবিক্রিয়ে ক্ষেত্রে সহায়ক স্বাভাবিক ব্যবহাৰ নেওয়া যুক্তিমূল্য যেমন- পরিপাকনালীর অশোষিত উপাদান সরিয়ে কেলা, ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণ এবং প্রযোজনে প্রাইমিটিনিক সহায়ক চিকিৎসা।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগলের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫°সে. তাপমাত্রার নিচে এবং ওক্তানে রাখুন।

উপহাসনা: ট্রাইলক® 8 ওএফটি: প্রতিটি কার্টনে আলু-আলু ব্লিস্টারে আছে ১৪×৩ ট্যাবলেট।

ট্রাইলক® 5 ওএফটি: প্রতিটি কার্টনে আলু-আলু ব্লিস্টারে আছে ১৪×৩ ট্যাবলেট।

ট্রাইলক® 8 চায়ে খাওয়ার ট্যাবলেট: প্রতিটি কার্টনে আলু-আলু ব্লিস্টারে আছে ১৪×৩ ট্যাবলেট।

ট্রাইলক® 5 চায়ে খাওয়ার ট্যাবলেট: প্রতিটি কার্টনে আলু-আলু ব্লিস্টারে আছে ১৪×৩ ট্যাবলেট।

ট্রাইলক® 10 ট্যাবলেট: প্রতিটি কার্টনে আলু-আলু ব্লিস্টারে আছে ১৪×৩ ট্যাবলেট।

ট্রাইলক® 8 ওরাল গ্লাউটিলস: প্রতিটি কার্টনে আছে ১৪×৩ স্যাপ্লি।

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.

