

Clobecort®

Clobetasone Butyrate BP 0.05%

Description: Clobecort® (Clobetasone Butyrate 0.05%) is a corticosteroid used in dermatology for treating such skin inflammation as seen in eczema, psoriasis and other forms of dermatitis.

Mode of Action: Clobetasone Butyrate 0.05% is a topically active corticosteroid which provides an exceptional combination of activity and safety. It is more effective in the treatment of eczemas than 1% Hydrocortisone or the less active synthetic steroid preparations that are in common use. It has little effect on hypothalamic-pituitary-adrenal function.

Composition

Clobecort® Cream: Each gm cream contains 0.5 mg Clobetasone Butyrate BP.

Clobecort® Ointment: Each gm ointment contains 0.5 mg Clobetasone Butyrate BP.

Indication: Clobecort® preparations are indicated for the treatment of eczema and dermatitis of all types including atopic eczema, photodermatitis, otitis externa, primary irritant allergic dermatitis (including napkin rash), intertrigo, prurigo nodularis, seborrhoeic dermatitis and insect bite reactions. Clobecort® may be used as a maintenance therapy between courses of one of the more active topical steroids.

Dosage and administration: Apply Clobecort® to the affected area up to four times a day until improvement occurs, then the frequency of application may be reduced.

Contraindication: Skin lesions caused by infection with viruses (e.g. herpes simplex, chicken pox), fungi (e.g. candidiasis, tinea) or bacteria (e.g. impetigo), hypersensitivity to the preparations.

Side effect: In the unlikely event of signs of hypersensitivity appearing, application should be stopped immediately. When large areas of the body are being treated with Clobetasone Butyrate 0.05%, it is possible that some patients will absorb sufficient steroid to cause transient adrenal suppression despite the low degree of systemic activity associated with Clobetasone Butyrate 0.05%. There are reports of pigmentation changes and hypertrichosis with topical steroids.

Use in pregnancy and lactation: There is inadequate evidence of safety in human pregnancy. Topical administration of corticosteroids to pregnant animals can cause abnormalities of fetal development including cleft palate and intrauterine growth retardation. There may therefore be a very small risk of such effects in the human fetus.

Precaution: Extreme caution is required in napkin eruption (as the napkin may act as an occlusive dressing and increase absorption) and treatment should not normally exceed seven days. Appropriate antimicrobial therapy should be used whenever treating inflammatory lesions which have been infected. Any spread of infection requires withdrawal of topical corticosteroid therapy and systemic administration of antimicrobial agents. As with all corticosteroids, prolonged application to the face is undesirable. If applied to the eyelids, care is needed to ensure that the preparation does not enter the eye as glaucoma might result.

Drug interaction: There have no available data of potentially hazardous interactions been reported.

Overdose: Acute overdosage is very unlikely to occur, in the case of chronic use.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25°C temperature and protected from light.

Packing

Clobecort® Cream: Each carton has a tube containing 25 gm cream.

Clobecort® Ointment: Each carton has a tube containing 25 gm ointment.

ক্লোবিকট®

ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট বিপি ০.০৫%

বর্মন: ক্লোবিকট® (ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট ০.০৫%) একটি কর্টিকোস্টেরয়েড যা একজিমা, সোরিয়াসিস এবং অন্যান্য চর্মরোগের প্রাদাহ চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কার্যপ্রক্রিয়া: ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট ০.০৫% একটি ত্বকে সক্রিয় কর্টিকোস্টেরয়েড যা কার্যকারিতা এবং সুরক্ষার একটি ব্যাক্তিগৌম সময়সূচী সরবরাহ করে। এটি ১% হাইড্রোকোটিসন বা কম সক্রিয় সিস্টেটিক স্টেরয়েডের চেয়ে একজিমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর। হাইপোথালামিক-পিটুইটারি-অ্যাড্রেনাল ফার্শেনে এটির খুব কম প্রভাব রয়েছে।

উপাদান

ক্লোবিকট® ক্রিম: প্রতি গ্রাম ক্রিমে আছে ০.৫ মিলি ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট বিপি।

ক্লোবিকট® অয়েক্টমেন্ট: প্রতি গ্রাম অয়েক্টমেন্টে আছে ০.৫ মিলি ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট বিপি।

নির্দেশনা: ক্লোবিকট® এটেপিক একজিমা, ফিটোডার্মাইটিস, প্রথমেরি এক্সের্টোর্স, প্রথমেরি ইলিয়াস্ট আলার্জিক ডার্মাটাইটিস (নায়াপকিক ফুরুরুভিসেস), ইন্টারট্রিপি, ফ্রিরিপো নোড্রুলিস, সেবোরিক কার্মার্কাইটিস এবং পোকোর কামড়সহ সকল ধরনের একজিমা এবং চর্মরোগের চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত। ক্লোবিকট® কে অধিক শক্তিশালী স্টেরয়েডগুলির রক্ষণাবেক্ষণ থেরাপি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাত্রা ও ব্যবহার: উন্নতি না হওয়া পর্যবেক্ষণে আজুভেন্ট ছানে ক্লোবিকট® ক্রিম বা অয়েক্টমেন্ট দিনে চারবার করে প্রয়োগ করতে হবে, তারপর পর্যায়ক্রমে ওরুধ প্রয়োগ করতে হবে।

বিরুদ্ধ ব্যবহার: (মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): ভাইরাসের সংক্রমণিত ত্বকের সংক্রমণ (যেমন- হার্পিস সিমপেক্স, চিমেন পোর), ছাঁকাক সংক্রমণ (যেমন- ক্যার্যারিয়াসিস, চিমিয়া) বা ব্যাকটেরিয়া (যেমন- ইমপটিজে) এবং এ ওয়ুবের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া: হাইপারসেন্সিটিভির লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরে এটির ব্যবহারে অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। যখন শরীরের বৃহস্পতির অংশে ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট ০.০৫% দিয়ে চিরিক্ষা করা হয়, তখন এটি সম্ভব যে ক্লোবিটাসন বিউটাইরেটে ০.০৫% এর মাত্রা কম থাকা সত্ত্বেও কিছু মৌলি ক্ষুণ্ণায়া আল্ড্রিজেন দমন করার জন্য পর্যাপ্ত স্টেরয়েড হ্রাস করতে পারে। টপিক্যাল স্টেরয়েডের সাথে পিপ্পামেটেশন প্রার্বন্তর্মেট এবং হাইপারট্রিকোসিস ঘটতে পারে।

গৰ্ভাবস্থা এবং স্ত্রীদানন্দকলে ব্যবহার: মানুষের গৰ্ভাবস্থায় সুরক্ষার অপ্রতুল প্রমাণ রয়েছে। গৰ্ভবতী প্রাণীতে কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রয়োগের ফলে ভূমির বিকাশের অভিভাবিক দেখা দিতে পারে যেমন-ক্লেইট প্যালেট এবং ইন্ট্রাইটেচেনিন বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া।

কিন্তু মানুষের ভূমি এ জাতীয় অভাব খুব সামান্য আছে।

স্বাধীনত: নায়াপকিন এপ্রেগ্নেশনের ক্ষেত্রে চেম্প স্বাধীনত প্রয়োজন (চেম্প নায়াপকিন অভিন্নত ভেসিস হিসাবে কাজ করতে পারে এবং শেষে বাড়িয়ে দিতে পারে) এবং চিরিক্ষা সাধারণত সাত দিনের বেশি হওয়া উচিত নয়। যখন প্রদাহে সংক্রমণ হয় তখন উপরুক্ত এক্টিমাইজেবিল মেডিপি ব্যবহার করা উচিত। সংক্রমণের প্রসারের ঘাসে ত্বকের কর্টিকোস্টেরয়েড থেরাপি প্রয়োগ করা দরকার এবং সিস্টেমিক আল্টিমাইজেবিল এজেন্ট দিতে হবে। সম্ভু কর্টিকোস্টেরয়েড চেহারার নীর্মলিন প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি চেহারের পাতায় প্রয়োগ করা হয় তবে যেহেতু সতর্কতার সাথে করতে হবে যেন চোখে প্রবেশ না করে কারণ এটাতে গুরুকোমা হতে পারে।

অন্য ওয়ুবের সাথে ত্বকের প্রতি: মানুষাক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভবনা খুব কম।

মাত্রাধিক্য: ক্লোবিকট® ক্রিম: প্রতিটি কার্টনে একটি টিউবে আছে ২৫ গ্রাম ক্রিম।

ক্লোবিকট® অয়েক্টমেন্ট: প্রতিটি কার্টনে একটি টিউবে আছে ২৫ গ্রাম অয়েক্টমেন্ট।

0727-01

Opsonin

Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.