

Betson®

Betamethasone Dipropionate BP

Description: Betson® is a preparation of Betamethasone Dipropionate which is a topical corticosteroid with anti-inflammatory, antipruritic and vasoconstrictive properties.

Mode of action: Betamethasone Dipropionate (Betson®) induces peptides called lipocortins. Lipocortins antagonize phospholipase A₂, an enzyme which causes the breakdown of leukocyte lysosomal membranes to release arachidonic acid. This action decreases the subsequent formation and release of endogenous inflammatory mediators including prostaglandins, kinins, histamine.

Pharmacokinetics: Betamethasone Dipropionate (Betson®) can be absorbed from normal intact skin. Corticosteroids are bound to plasma proteins in varying degrees. Corticosteroids are metabolized primarily in the liver. It is excreted by the kidneys.

Composition: Betson® Cream: Each gm cream contains Betamethasone Dipropionate BP 0.643 mg equivalent to Betamethasone 0.5 mg.

Betson® Ointment: Each gm ointment contains Betamethasone Dipropionate BP 0.643 mg equivalent to Betamethasone 0.5 mg.

Indications: Betson® cream and ointment are indicated for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of resistant or severe corticosteroid-responsive dermatoses such as atopic eczema, contact dermatitis, psoriasis.

Dosage & administration: Apply a thin film of Betson® ointment or cream to the affected skin once or twice daily. Treatment with Betamethasone Dipropionate should be limited to 50g per week.

Contraindications: Hypersensitivity to Betamethasone Dipropionate, other corticosteroids or any components in this preparation. Like other topical corticosteroids, Betamethasone Dipropionate is contraindicated in viral infections of the skin, such as vaccinia, varicella and Herpes simplex, also tuberculosis, acne rosacea, fungal skin infections (moniliasis), perioral dermatitis and ulcerative conditions.

Side effects: The most frequent side effects reported with Betamethasone Dipropionate are mild to moderate transient burning/stinging, dry skin, pruritus, irritation and folliculitis.

Use in pregnancy & lactation: Topical administration of corticosteroids to pregnant animals can cause abnormalities of fetal development. There is inadequate evidence of safety in lactation.

Precautions: Betamethasone Dipropionate should not be used in or near the eyes. If a favourable response does not occur promptly, Betamethasone Dipropionate should be discontinued until the infection has been controlled adequately. Prolonged use of topical corticosteroid preparations may produce striae or atrophy of the skin or subcutaneous tissue. If this occurs, treatment should be discontinued.

Drug interactions: There is no evidence of any kind of interaction.

Over dosage: Acute overdose with the ointment is unlikely and would not be expected to lead to a lifethreatening situation.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25°C temperature and protected from light.

Packaging

Betson® Cream: Each pack has a tube containing 20 gm cream.

Betson® Ointment: Each pack has a tube containing 20 gm ointment.

বেটসন®

বেটামিথাসন ডাইপ্রিপওনেট বিপি

বিবরণ: বেটসন® হলো বেটামিথাসন ডাইপ্রিপওনেট প্রস্তুতি যা ত্বকীয় কর্টিকষ্টেরয়েড যেটা প্রদাহবিরোধী, চুলকানি নাশক এবং রক্তনালী সংকোচক গুণাঙ্গ সমৃদ্ধ।

কার্মসূচিত: বেটামিথাসন ডাইপ্রিপওনেট (বেটসন®) লিপোকার্টিন নামক পেপটাইডকে প্রভাবিত করে। লিপোকার্টিন ফসফোলাইপেজ এ-২ নামক ইনজাইমকে বক করে যা লিপোকার্সাইড লাইসোসেমাল খিলোকে তেসে অ্যারাকিডোনিক এসিড মুক করতে সাহায্য করে। এর ফলে অস্তর্জাত প্রদাহের জন্য দায়ী উপাদান যেমন প্রষ্টায়ানভিনস, কিনিনস, হিসিমিন এর পরবর্তী গঠন এবং ছাড়িয়ে পড়া বন্ধ করে।

ওপুনের উপর শরীরের ক্রিয়া (ক্র্যানিকেপাইমেট্রি): বেটামিথাসন ডাইপ্রিপওনেট (বেটসন®) স্বতন্ত্র অক্ষত চামড়া হতে সোষীত হয়। কর্টিকষ্টেরয়েডলো প্লাজমা প্রোটিনের সাথে নানা মাত্রায় আবদ্ধ হয়। কর্টিকষ্টেরয়েড প্রাথমিকভাবে ব্যক্তে বিপাক হয়। এগুলো কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে নিষ্কাশিত হয়।

উপাদান: বেটসন® ক্রীম: প্রতি গ্রাম ক্রীম এ রয়েছে বেটামিথাসন ০.৫০ মিলিগ্রাম ডাইপ্রিপওনেট বিপি হিসাবে।

বেটসন® অয়েন্টেমেন্ট: প্রতি গ্রাম অয়েন্টেমেন্ট এ রয়েছে বেটামিথাসন ০.৫০ মিলিগ্রাম ডাইপ্রিপওনেট বিপি হিসাবে।

নির্দেশনা: বেটসন® ক্রীম এবং অয়েন্টেমেন্ট তাঁবা কর্টিকষ্টেরয়েড-এ প্রতিক্রিয়ালী বা প্রতিরোধী ডার্মাটোসেস যেমন-অ্যাটেপিক একজেমা, কন্ট্রার ডার্মাটাইটিস, সোরিয়াসিস এবং ধরনের প্রদাহ এবং চুলকানির জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ধরণগতি: বেটসন® ক্রীম বা অয়েন্টেমেন্টের পাতলা ছিম আক্রান্ত চামড়ায় দিনে একবার বা দুইবার প্রয়োগ করতে হবে। চিকিৎসার বেটামিথাসন ডাইপ্রিপওনেটের ব্যবহার প্রতি সন্তানে ৫০ গ্রাম সীমিত রাখা উচিত।

ব্যবহারের যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: : অন্যান্য কর্টিকষ্টেরয়েড বা এই ওয়ুধের অন্য কোন উপাদানের প্রতি অভিসংবেদনশীল হলে বেটামিথাসন ডাইপ্রিপওনেটের ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যান্য কর্টিকষ্টেরয়েডের মতো বেটামিথাসন ডাইপ্রিপওনেট, তুকের তাইল সজ্জম যেমন-জলবস্ত, হারপিস সিপ্পের ছাড়াও যক্ষ, একনি রোসাসিয়া তুকের ফাংগাল সংক্রমণ (মনিলিয়াসিস), পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস এবং আলসারেটিভ অবহার জন্য ব্যবহারের অনুমতিপ্পোর্ণী।

পার্শ্বগতিক্রিয়া: বেটামিথাসন ডাইপ্রিপওনেটের ব্যবহারের ফলে সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হলো হালকা বা তাঁবা অস্থায়ী জ্বালাপোড়া/যন্ত্রণা, শুক দুক, চুলকানি, অসুস্থি এবং ফলিকুলাইটিস।

গর্ভবত্তা ও স্তনদানকালে ব্যবহার: গর্ভবত্তা ও স্তনদানকালে ব্যবহার: গর্ভবত্তা ও স্তনদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপদ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।

সর্তর্কতা: বেটামিথাসন ডাইপ্রিপওনেট ঢোকা বা ঢোকের কাছাকাছি ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি দ্রুত কোন ফলাফল না পাওয়া যাব অথবা স্তনদান পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হওয়া মাঝেই বেটামিথাসন ডাইপ্রিপওনেটের ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। তুকের কর্টিকষ্টেরয়েডের অভিযোগ ব্যবহার চামড়া অথবা সাবকিউটেনাস টিসুস ট্রেই বা আট্রিপির সৃষ্টি করে। এ রকম ঘটনার চিকিৎসা ব্যবহার করা উচিত।

অন্য ওয়ুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: প্রারম্পরিক প্রতিক্রিয়ার কোন ধরনের তথ্য পাওয়া যায় নাই।

মাত্রাবিক্রিয়া: ক্রীম বা অয়েন্টেমেন্টের ব্যবহারে তাঁবার সম্ভাবনা অনেক কম এবং আশংকাজনক কোন উপসর্গ দেখায় না।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫°C সে. তাপমাত্রার নিচে এবং শুষ্কস্থানে রাখুন।

উপরাগণা

বেটসন® ক্রীম: প্রতি কাটনে একটি টিউবে আছে ২০ গ্রাম ক্রীম।

বেটসন® অয়েন্টেমেন্ট: প্রতি কাটনে একটি টিউবে আছে ২০ গ্রাম অয়েন্টেমেন্ট।

০৮৫-০



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.