

Instavit®

Vitamin B Complex + Vitamin C

Composition:

Each vial contains:

Active Ingredients	Qty. (mg)
Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate USP)	2.5
Vitamin B2 (as Riboflavin Sodium Phosphate BP)	3.6
Nicotinamide BP	40
Pantothenic Acid (as Dexamphenol USP)	15
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride BP)	4
Biotin BP	0.06
Folic Acid BP	0.4
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin BP)	0.005
Ascorbic Acid (as Sodium Ascorbate USP)	100

Each 10 ml Ampoule Contains: 10 ml Water for Injection.


Pharmacology: Instavit® is a sterile, lyophilized powder of water-soluble vitamins for injection. It contains balanced amount of all the important water soluble vitamins which act as coenzymes of vital enzymes associated with crucial physiological processes, energy metabolism, cell growth and replenishment especially in brain and nerve cells. Vitamin C acts as an antioxidant and helps in collagen formation. Intravenous administration of this combination gives prompt action.

Indications: Instavit® is intended as a supplement for intravenous nutrition in order to meet the daily requirements of the water soluble vitamins of Infant, Child & Adult patients.

Dosage and Administration:

Adults and children weighing 10 kg or more : 1 vial (10 ml) daily. Children weighing less than 10 kg : should be given 1 ml of the dissolved mixture per kg body weight/day.

Method of IV Injection Preparation:



Side Effects: Allergic reactions may occur in patients hypersensitive to any component of the preparation, e.g. Thiamine.

Precautions: When Lyophilized Powder for injection is diluted with water based solutions, the admixture should be protected

from light. This is not necessary if lyophilized powder for injection is diluted with intralipid because of the protective effect of the fat emulsion.

Contraindications: Known hypersensitivity to any of the components, e.g. Thiamine.

Use in Pregnancy and Lactation: Animal reproduction studies or clinical investigations during pregnancy have not been carried out with this preparation. However, there are published reports on safe administration of water soluble vitamins in this patient group.

Overdosage: No adverse effects of an overdose of water soluble multivitamin have been reported, with exception of cases of extremely high parenteral doses. The possibility of hypervitaminosis A and D should be considered if lyophilized powder for injection is dissolved in another multivitamin injection.

Drug Interactions: Vitamin B6 can reduce the effect of Levodopa. Folic Acid may lower the serum concentration of Phenytion.

Storage: *Before reconstitution:* Keep out of reach of children, Store in a dry place, below 25° C temperature and protected from light.

After reconstitution: The reconstituted Instavit® should be added to the infusion solution aseptically immediately before the start of the infusion & used within 24 hours.

Packaging:

Instavit® IV Injection: Each box contains 1 vial of water soluble multivitamin powder for injection, 1 ampoule of WFI (10 ml), 1 disposable syringe (10 ml), 1 infusion set, 1 first aid bandage, 1 alcohol pad & 1 ampoule breaker.



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh
® Registered Trade Mark

ইনস্টাভিট[®]

ভিটামিন বি কমপ্লেক্স + ভিটামিন সি

উপাদান:

প্রতিটি ভায়ালে আছে:

সংক্ষিপ্ত উপাদান	পরিমাণ (মিলি)
ভিটামিন বি১ (থায়ামিন মনোইন্ট্রেট ইউএসপি হিসেবে)	২.৫
ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লুক্সিন সোডিয়াম ফসফেট বিপি হিসেবে)	৩.৬
নিকোটিনামাইড বিপি	৮০
প্যারটোক্রিনিক এসিড (ডেক্সপ্যানথেনেল ইউএসপি হিসেবে)	১৫
ভিটামিন বি৬ (পাইরিউক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি হিসেবে)	৮
বায়োটিন বিপি	০.০৬
ফলিক এসিড বিপি	০.৪
ভিটামিন বি১ (সায়ানোকোবালামিন বিপি হিসেবে)	০.০০৫
এসকরবিক এসিড (সোডিয়াম এসকরবেট ইউএসপি হিসেবে)	১০০

প্রতিটি ১০ মিলি এ্যাম্পুলে আছে: ১০ মিলি ওয়াটার ফর ইনজেকশন।

ফার্মাকোলজি: ইনস্টাভিট[®] হচ্ছে ইনজেকশন হিসেবে প্রয়োজন করার জন্য পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের মিশ্রণ যা জীবাণুমুক্ত এবং লায়োফিলাইজড। এতে পানিতে দ্রবণীয় সকল ভিটামিন সঠিক পরিমাণে রয়েছে যা বিভিন্ন এনজাইম-এর কোএনজাইম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ শরীরীরক প্রক্রিয়া, শতিগুর বিপাক, কেবেষে বৃক্ষি এবং বিশেষ করে মাস্টিকের ও মাঝু কোষের ক্ষয়পূরণ করে। ভিটামিন সি অ্যান্টিঅক্সিডেট হিসেবে কাজ করে এবং কোলাজেন গঠনে সাহায্য করে। শিরাপথে ভিটামিন সমূহ প্রয়োগের ফলে দ্রুত কাজ শুরু করে।

নির্দেশনা: ইনস্টাভিট[®] হচ্ছে শিরাপথে ব্যবহৃত সম্পূর্ণ পুষ্টি হিসেবে নবজাতক, শিশু ও প্রাত্তুর্বযুক্ত রোগীদের দৈনন্দিন পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন সমূহের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাত্তুর্বযুক্ত এবং শিশুদের ওজন ১০ কেজি বা তার বেশি হলে: দৈনিক ১টি ভায়াল (১০ মিলি)। শিশুদের ওজন ১০ কেজির কম হলে: দৈনিক শরীরের ওজনের প্রতি কেজিতে ১ মিলি অনুপাতে দ্রবণীয় মিশ্রণ দিতে হবে।

আইডি ইনজেকশন তৈরির নিয়ম:



প্রক্রিয়া: এই উপরের কোন উপাদান যেমন থায়ামিন-এর প্রতি সংবেদনশীলতা আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে অ্যালার্জিক ক্রিয়া হতে পারে।

সতর্কতা: যদি লায়োফিলাইজড পাউডার ফর ইনজেকশন পানি মিশ্রিত দ্রবণ দ্বারা দ্রুতভাবে কাজ হয় তবে অবশ্যই আলো থেকে দূরে রাখতে হবে। কিন্তু ফ্যাট

ইমালসনের আলো প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে লায়োফিলাইজড পাউডার ফর ইনজেকশন যদি লিপিতে দ্রুতভাবে কাজ হয় তবে এই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে না।

প্রতিনির্দেশনা: যদি কোন উপাদান যেমন থায়ামিন-এর প্রতি সংবেদনশীলতা আছে এসকল রোগীর জন্য এই ওয়ুধ প্রতিনির্দেশিত।

গৰ্ভবত্তায় এবং দুর্ঘটনাকালে: প্রাণীর অজননতত্ত্বে বা গৰ্ভবত্তায় এই ওয়ুধের ফ্লিমিক্যাল পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে অনেক প্রতিবেদনে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের নিরাপদ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

মাত্রাবিক্রিয়া: খুবই উচ্চমাত্রার প্রয়োন্তেরাল মাত্রা ব্যাতীত পানিতে দ্রবণীয় মাল্টিভিটামিনের কোন প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদি লায়োফিলাইজড পাউডার ফর ইনজেকশন অন্য কোন মাল্টিভিটামিনের সাথে মিশানো হয় তবে ভিটামিন এবং ভিটামিন হাইড্রোভিটামিনোসিস হতে পারে।

অন্য ওয়ুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ভিটামিন বি৬ লিভোডোপ্রা-এর কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। ফলিক এসিড রক্তসে ফিনাইটায়িন-এর ঘনত্ব কমিয়ে দিতে পারে।

সংরক্ষণ: দ্রবণ মিশ্রণের আগে: আলো থেকে দূরে, ২৫° সে. তাপমাত্রার নিচে শুক্রান্তে রাখুন। সকল ওয়ুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

দ্রবণ মিশ্রণের পরে: পুনর্গঠিত ইনস্টাভিট[®] প্রয়োগের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ইনফিউশন দ্রবণের সাথে মেশাতে হবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

উপস্থাপনা:

ইনস্টাভিট[®] আইডি ইনজেকশন: প্রতিটি কার্টনে আছে পানিতে দ্রুতভাবে মাল্টিভিটামিন পাউডার ফর ইনজেকশনের ১টি ভায়াল, ১০ মিলি ওয়াটার ফর ইনজেকশন ১টি এ্যাম্পুল, ১টি ১০ মিলি ডিসপোজেবল সিরিঙ্গ, ১টি ইনফিউশন সেট, ১টি ফাস্ট এইড ব্যাটেজ, ১টি অ্যালকোহল প্যান্ড এবং একটি এ্যাম্পুল ব্রেকার।

0834-01

Opsonin
Opsonin Pharma
Idea for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh
® Registered Trade Mark