

Zovia® IV

Multivitamin

Description: Zovia® IV is a sterile, lyophilized powder for injection/infusion which contains nine water-soluble and three fat soluble vitamins. Mixed micelles is used as a solubilizing agent. It is presented as a lyophilized, sterile powder that is to be reconstituted with 5ml of Water for injections or other parenteral fluids (e.g. as 0.9% Sodium chloride or 5% Glucose solution), prior to administration by parenteral route.

Composition: Zovia® IV for injection/infusion: Zovia® IV is a lyophilized, sterile powder for injection/infusion which contains both water soluble and fat soluble vitamins.


Each vial of Zovia® IV contains:
Vitamin A BP 3500 IU, Vitamin D3 BP 220 IU, Vitamin E USP 11.2 IU, Ascorbic Acid BP 125 mg, Vitamin B1 BP 3.51 mg, Vitamin B2 BP 4.14 mg, Nicotinamide BP 46 mg, Pantothenic Acid BP 17.25 mg, Vitamin B6 BP 4.53 mg, Vitamin B12 BP 6 mcg, Folic Acid BP 414 mcg, Biotin BP 69 mcg.

Indications: Zovia® IV is indicated as a daily multivitamin maintenance dosage for adults and children aged 11 years and above receiving parenteral nutrition. It is also indicated in other situations where administration by the intravenous route is required. Such situations include surgery, extensive burns, fractures and other trauma, severe infectious diseases and comatose states, which may provoke a "stress" situation with profound alterations in the body's metabolic demands and consequent tissue depletion of nutrients.

Dosage and Administration:

Adults and children aged 11 years and above: 1 vial/day
The single dose vial of Zovia® IV is reconstituted by adding 5ml of sterile Water for injection or other intravenous fluids like 0.9% Sodium Chloride injection or 5% Glucose injection. 5 ml of diluent should be added by means of sterile syringe into the vial and gently mixed to dissolve the lyophilized powder. The entire volume of the resultant solution should then be administered by slow Intravenous injection (at least over 10 minutes) or further diluted for intravenous infusion. To minimize vitamin losses in parenteral nutrition admixtures, add the vitamins immediately prior to administration and complete administration within 24 hours.

Method of IV injection Preparation:



Contraindications: Zovia® IV is contraindicated in patients with pre-existing hypervitaminosis or known hypersensitivity to any of the active ingredients. This product should not be injected to patients with pre-existing intolerance to thiamine. Similarly, this product should not be administered to patients with impaired hepatic function. This preparation should not be administered to those suffering from hyperparathyroidism due to hypercalcemic complications.

Side Effects: Anaphylactic reactions have been reported following large intravenous doses of Thiamine. Urticaria and rash have also been associated with this preparation. There have been very rare reports of anaphylactic reactions following IV injection/infusion with this preparation over 1-4 minutes.

Use in Pregnancy and Lactation: The use of this preparation has not been studied in human during pregnancy. Zovia® IV should be given to a pregnant woman only if clearly needed. The use of this product in lactating women is not recommended.

Precautions: Anaphylactic reactions may occur in allergic subjects who are susceptible to Thiamine (Vitamin B1) and nicotinamide components of this product. Mild allergic reactions such as sneezing or mild asthma are warning signs that further injection/infusion may give rise to anaphylactic shock. Due to glycholic acid content, repeated and prolonged administration in patients with jaundice of hepatic origin or severe biochemical evidence of cholestasis requires careful monitoring of liver function. Also in the case of impaired kidney function, fat-soluble vitamin levels should be carefully monitored.

Drug Interactions: Patients receiving drugs that bind to a1-acid glycoprotein should be closely monitored for increases in response to these drugs, e.g. propranolol, prazosin and quinidine. Folic acid may increase the metabolism of some antiepileptics, such as phenobarbital, phenytoin and primidone. Pyridoxine can reduce the effect of levodopa. Bleomycin can be inactivated by ascorbic acid and riboflavin.

Overdosage: Accumulation of Vitamin A and Vitamin D may be occurred with prolonged administration of high doses.

Storage: *Before reconstitution:* Store below 25°C. Protect from light and do not freeze. *After reconstitution:* The reconstituted product should be used immediately or it should be stored at 2°C to 8°C for not more than 24 hours. Discard any unused portion of the reconstituted solution.

Packaging: Zovia® IV for injection/infusion: Each box contains one vial of multivitamin, one 5 ml sterile disposable syringe, 10 ml water for injection, one infusion set, ampoule breaker, first aid band & alcohol pad.



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh
® Registered Trade Mark

জোভিয়া® আইভি মাল্টিভিটামিন

বিবরণ: জোভিয়া® আইভি ইনজেকশন/ইনফিউশন তৈরির জীবাণুমুক্ত, লায়োফিলাইজড পাউডার যার মধ্যে ৯টি পানিতে দ্রবণীয় ও ৩টি ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন বিদ্যমান। ইহাতে দ্রবণীয় উপাদান হিসেবে মাইসেল এর শিশু ব্যবহার করা হচ্ছে। ইহা জীবাণুমুক্ত, লায়োফিলাইজড পাউডার হিসেবে রয়েছে যা প্যারেনটেরিল পথে প্রয়োজেনে পূর্বে ৫ মিলি ওয়াটার ফর ইনজেকশন বা অন্য কোনো প্যারেনটেরিল তরল যেমন ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড অথবা ৫% প্রুকোজের সাথে মিশ্রিত করতে হবে।

উপাদান: জোভিয়া® আইভি ইনজেকশন/ইনফিউশন: জোভিয়া® আইভি ইনজেকশন/ইনফিউশনের জন্য ব্যবহৃত জীবাণুমুক্ত, লায়োফিলাইজড পাউডার যার মধ্যে পানি ও ফ্যাটে দ্রবণীয় উভয় ভিটামিনসমূহ বিদ্যমান।

প্রতিটি জোভিয়া® আইভি ভায়ালে রয়েছে: ভিটামিন এ বিপি ৩৫০০ আইইট, ভিটামিন ডি৩ বিপি ২২০ আইইট, ভিটামিন ই ইউএসপি ১১.২ আইইট, এসকরবিক এসিড বিপি ১২২ মিশ্বা, ভিটামিন বি বিপি ৩.৫৫ মিশ্বা, ভিটামিন বি বিপি ৪.১৮ মিশ্বা, প্যানটোথেনিক এসিড বিপি ৪.৬ মিশ্বা, প্যানটোক্রেটেজাম, ফলিক এসিড বিপি ৪১৪ মাইক্রোগ্রাম, বায়োটিন বিপি ৬৯ মাইক্রোগ্রাম।


নির্দেশনা: জোভিয়া® আইভি ব্যবহৃত করে যে এর চেয়ে বড় শিশু যারা প্যারেনটেরিল পুষ্টি প্রাপ্ত করছেন তাদের প্রাতাহিক মাল্টিভিটামিনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্দেশিত। এছাড়া যে সকল অবস্থায় শিশুর প্রয়োজন স্থানেও ইহা নির্দেশিত যেমন- সার্জারি, অত্যধিক পোড়া, হাত ভাঙ্গা, মাত্রাধিক সংক্রিমিত রোগ, কোমা এবং অন্যান্য অস্থায় যেখানে অত্যধিক চাপের করাণে শরীরের মেটাবোলিক চাহিদাতে পরিবর্তন হয় এবং যার ফলে টিস্যুতে পুঁতি ঘাস্তি দেখা দেয়।

মাত্রা ও প্রয়োগ: বয়ক ও শিশুর বয়স ১১ বছর বা এর চেয়ে বড় শিশু যারা প্যারেনটেরিল পুষ্টি প্রাপ্ত করছেন তাদের প্রাতাহিক মাল্টিভিটামিনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্দেশিত। এছাড়া যে সকল অবস্থায় শিশুর প্রয়োজন স্থানেও ইহা নির্দেশিত যেমন- সার্জারি, অত্যধিক পোড়া, হাত ভাঙ্গা, মাত্রাধিক সংক্রিমিত রোগ, কোমা এবং অন্যান্য অস্থায় যেখানে অত্যধিক চাপের করাণে শরীরের মেটাবোলিক চাহিদাতে পরিবর্তন হয় এবং যার ফলে টিস্যুতে পুঁতি ঘাস্তি দেখা দেয়।

মাত্রা ও প্রয়োগ: বয়ক ও শিশুর বয়স ১১ বছর বা অধিক হলে- প্রতিদিন ১টি ভায়াল।

প্রতিটি জোভিয়া® আইভি ভায়ালের উপাদানসমূহকে ৫ মিলি ওয়াটার ফর ইনজেকশন বা শিশুপথে ব্যবহার্য অন্য কোন তরল যেমন- ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড বা ৫% প্রুকোজ দ্রবণে মিশ্রিত করতে হবে। জীবাণুমুক্ত সিরিঙ্গ দিয়ে ৫ মিলি, লঘুকারককে প্রথমে ভায়ালের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে এবং ভালভাবে মিশ্রিত করে লায়োফিলাইজড পাউডারকে দ্রব্যভূত করতে হবে। তৈরিকৃত সম্পূর্ণ দ্রবণকে শিশুপথে ইনজেকশন মাধ্যমে (কমপক্ষে ১০ মিনিট ধরে) ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে অথবা অন্য কোন লম্বা করে শিশুপথে ইনফিউশন হিসেবে দিতে হবে। ভিটামিনের অপচয় রোধ করার জন্য প্রয়োজেন টিক পৰ্ব মুহূর্তে লঘুকারকের সাথে মিশ্রিত করতে হবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

আইভি ইনজেকশন তৈরির নিয়ম:



বিরুদ্ধ ব্যবহার: যে সকল রোগীর পর্য থেকেই হাইপারভিটামিনোসিস আছে অথবা এই ওয়ুব্রে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে জোভিয়া® আইভি নির্দেশিত নয়। যে সকল রোগী ধ্যায়ামিনের প্রতি সংবেদনশীল তাদের এই ওয়ুব্র দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে, যে সকল রোগীর যকৃতের কার্যক্ষমতা ক্রিপ্টুর্স তাদেরও এই ওয়ুব্র দেয়া যাবে না। ক্যালসিয়ামের আধিকাঙ্গনিত জটিলতার কারণে যারা হাইপারথাইরাডিজে আক্রান্ত তাদের এই ওয়ুব্র দেয়া যাবে না।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: উচ্চমাত্রার ধ্যায়ামিন শিশুপথে দেওয়ার ফলে অ্যানাফাইল্যাকটিক ক্রিয়া হতে পারে। আর্টিকেরিয়া ও র্যাশও হতে পারে। তবে এই ওয়ুব্রটি শিশুপথে ১-৪ মিনিট ধরে দেবার ফলে অ্যানাফাইল্যাকটিক ক্রিয়া হবার প্রতিবেদন খুবই কম দেখা গেছে।

গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার গর্ভবত্তায় এই ওয়ুব্রের নিরাপদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে গর্ভবত্তায় জরুরি প্রয়োজনে জোভিয়া® আইভি দেয়া যেতে পারে। স্তন্যদানকালেও এই ওয়ুব্রের ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

সতর্কতা: যে সকল রোগী এই ওয়ুব্রে উপাদান যেমন ধ্যায়ামিন (ভিটামিন বি১) এবং নিকোটিনামাইড এর প্রতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে অ্যানাফাইল্যাকটিক ক্রিয়া হতে পারে। মৃত্যু আলার্জিক ক্রিয়া যেমন হাঁচি বা মৃত্যু প্র্যাজমা, এ ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে পুনরায় ইনজেকশন/ইনফিউশন দেওয়ার ফলে অ্যানাফাইল্যাকটিক শক হতে পারে। গ্লাইকোকোলিক এসিডের উপস্থিতির কারণে এবাবিকদার ও অধিকতর সময় ধরে প্রয়োজেনে ক্ষেত্রে ভিডিস এবং কোলেস্ট্রাটিস এ আক্রান্ত রোগীর যকৃতের কার্যক্ষমতার পরিবর্তন স্তরকার্তার সাথে লক্ষ রাখতে হবে। কিডনির কার্যক্ষমতা ক্রিপ্টুর্স হলে ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন সমূহের পরিমাণ স্তরকার্তার সাথে লক্ষ রাখতে হবে।

অন্য ওয়ুব্রের সাথে প্রতিক্রিয়া: প্রোপানোলোল, আমোলিন এবং কুইনিন্ডিনের মত যে সব ওয়ুব্রে এ১ এসিড গ্লাইকোকোলিনের সাথে আবদ্ধ হয় সে সকল ওয়ুব্রের কার্যক্ষমতা বেড়ে যেতে পারে। ফলিক এসিড কিছু অ্যান্টি-ইপিলেপ্টিক ওয়ুব্র যেমন ফেনোবার-বিটাল, ফিনাইটাইল এবং প্রাইমাইডোনের মেটাবলিজম বাড়িয়ে দিতে পারে। পাইরিভিক্সিন, লিভোডেপ্স এর কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। এসকরবিক এসিড ও রিবোফ্লাইন, প্রিমাইসিনের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে।

মাত্রাধিক্রিয়া: উচ্চমাত্রায় ও বেশি দিন ধরে ব্যবহার করলে ভিটামিন এ ও ডি শরীরে জমা হতে পারে।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে, আলো থেকে দূরে এবং শুক ছানে রাখুন। দ্রবণ মিশ্রণের পূর্বে ২৫° সে. তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করতে হবে এবং হিমায়িত করা যাবে না। দ্রবণ মিশ্রণের পর: পুনর্গঠিত দ্রবণ সাথে সাথে ব্যবহার করে ফেলতে হবে অথবা ২° থেকে ৮° তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

উপস্থান: জোভিয়া® আইভি ইনজেকশন/ইনফিউশন: প্রতিটি কার্টনে আছে মাল্টিভিটামিনের ১টি ভায়াল, একটি ৫ মিলি জীবাণুমুক্ত ডিসপোজেবল সিরিঙ্গ, ১০ মিলি ওয়াটার ফর ইনজেকশন, একটি ইনফিউশন সেট, এ্যাস্প্রিল ব্রেকার, ফাস্ট এইড ব্যান্ড এবং অ্যালকোহল প্যাকেজ।

083-01

Opsonin
Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh
⑥ Registered Trade Mark