

Elasta® Sterile Eye Drops

Epinastine BP 0.05%

Description: Epinastine is a sterile eye drops which is an anti-allergic preparation for topical administration to the eyes.

Mode of action: Epinastine blocks H₁ receptor and inhibits release of histamine from mast cell thus controls itching associated with allergic conjunctivitis.

Composition: Elasta® Sterile Eye Drops: Each ml contains Epinastine Hydrochloride BP 0.5 mg.

Indications: Itching associated with allergic conjunctivitis.

Dosage and administration: 1 drop in the affected eye(s) twice daily or as directed by the physician.

Contraindications: No data found.

Side effects: Burning sensation in the eye, folliculosis, hyperemia, headache, sinusitis, cough and pharyngitis.

Use in pregnancy and lactation: Pregnancy Category C. Epinastine should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

It is not known whether this drug is excreted in human milk or not. Caution should be exercised when Epinastine is administered to a nursing woman.

Precautions: Patients should not wear a contact lens if the eye is red. Epinastine should not be used to treat contact lens related irritation. Contact lens should be removed prior to instillation of Epinastine.

Drug interactions: No data found.

Overdose: No data found.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25° C temperature and protected from light. Do not freeze. Do not touch dropper tip to any surface since this may contaminate this solution. Do not use after one month of first opening.

Packaging: Elasta® sterile eye drops: Each dropper bottle contains 5 ml sterile eye drops.



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh
® Registered Trade Mark.

ইলাস্টা® জীবাণুক্ত চোখের ড্রপস

ইপিনাস্টিন বিপি ০.০৫%

বিবরণ: ইপিনাস্টিন একটি অ্যালার্জি বিরোধী জীবাণুক্ত চোখের ড্রপস যা শুধুমাত্র চোখে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত।

কার্যপদ্ধতি: ইপিনাস্টিন এইচ-১ রিসেপ্টরকে বাধা প্রদান করে এবং মাস্ট সেল থেকে হিস্টামিনের নিঃসরণকে বাধা দেয়, এইভাবে অ্যালার্জিজনিত চোখের চুলকানি নিরস্ত্র করে।

ইপিনাস্টিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ০.৫ মিলিলিটার:

নির্দেশনা: অ্যালার্জিজনিত চোখের চুলকানি।

মাত্রা ও প্রয়োগ: আক্রান্ত চোখে ১ ফেট্টা করে দিনে ২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসর্যী ব্যবহার্য।

বিরুদ্ধ ব্যবহার: কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: চোখের জ্বালাপোড়া, ফলিকুলোসিস, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, মাথাৰ্থা, সাইনাস এর সংক্রমণ, কাশ, এবং ফ্যারিঞ্জাইটিস হতে পারে।

গর্ভবত্ত্ব ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগন্যাস্টিস ক্যাটগরি সি। ক্রমের সম্ভাব্য ক্ষতির তৃদিনায় গর্ভবত্ত্ব মায়ের সম্ভাব্য উপকারিতা বিবেচনা করে ব্যবহার করা উচিত। মাতৃদুর্দোহণ ইপিনাস্টিন নিঃস্তৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি। স্তন্যদানকালে ইপিনাস্টিন ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

সতর্কতা: চোখ লাল থাকলে কস্টার্ক লেস ব্যবহার করা উচিত নয়। ইপিনাস্টিন কস্টার্ক লেস-জনিত চোখ জ্বালা-পোড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। চোখে ইপিনাস্টিন ড্রপস প্রয়োগের আগে কস্টার্ক লেস খুলে ফেলা উচিত।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মাত্রার্থিক্য: কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫° C. তাপমাত্রার নিচে এবং শুক ছানে রাখুন। রেফিজারেটরে রাখবেন না। ড্রপারের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না, করণ তা দ্রবণকে দূর্ঘিত করতে পারে। প্রথম খোলার এক মাস পর ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

উপস্থিতনা: ইলাস্টা® জীবাণুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতিটি ড্রপার বোতলে রয়েছে ৫ মিলি জীবাণুক্ত চোখের ড্রপস।

0853-51



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh
® Registered Trade Mark.