

## Piloma® OSD Sterile Eye Drops

Pilocarpine Hydrochloride USP 2%

### Description

Pilocarpine is a parasympathomimetic alkaloid. It is a non-selective muscarinic receptor agonist.

### Mode of action

Pilocarpine is a direct acting cholinergic parasympathomimetic agent which acts through direct stimulation of muscarinic neuro receptors and smooth muscle. Pilocarpine produces miosis through contraction of the iris sphincter, causing increased tension on the scleral spur and opening of the trabecular mesh-work spaces to facilitate outflow of aqueous humour.

### Composition

**Piloma® OSD Sterile Eye Drops:** Each ml contains Pilocarpine Hydrochloride USP 20 mg.

### Indications

Closed-Angle Glaucoma and miosis.

### Dosage & administration

One or two drops in the affected eye(s) in every six hours or as directed by the physician.

### Contraindications

No data found.

### Side effects

No data found.

### Use in pregnancy & lactation

Pregnancy category C. It is not known whether this drug is excreted in human milk or not.

### Precautions

It is recommended that intraocular pressure measurement be performed regularly during therapy.

### Drug interactions

Concomitant administration of two different miotic drugs is not recommended because of potential interdrug antagonism, and potential development of unresponsiveness to both drugs. If more than one topical ophthalmic medicinal product is being used, the medicines must be administered at least 5 minutes apart.

### Over dosage

If it occurs, therapy with anti-cholinergic agents, such as atropine, may be necessary.


### Storage

Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25°C temperature and protected from light. Do not freeze. Do not touch the dropper tip to surfaces since this may contaminate the suspension. Do not use after two month of first opening.

### Packaging

**Piloma® OSD Sterile Eye Drops:** Each OSD bottle contains 10 ml sterile eyes drops.

### Application Process



**Opsonin**  
Opsonin Pharma  
Ideas for healthcare

Manufactured by  
**Opsonin Pharma Limited**  
Rupatali, Barishal, Bangladesh.  
® Registered Trade Mark.

## পাইলোমা® ওএসডি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস

পাইলোকারপিন হাইড্রোক্লোরাইড ইটএসপি ২%

### বিবরণ

পাইলোকারপিন একটি প্যারাসিমপ্যাথোমাইমেটিক অ্যালকালয়েড এবং নন-সিলেক্টিভ মাসকারিনিক রিসেপ্টর এগনিন্স্ট।

### কার্যপদ্ধতি

পাইলোকারপিন সরাসরি কোলিনার্ডিক প্যারাসিমপ্যাথোমাইমেটিক এগনিন্স্ট যা মাসকারিনিক রিসেপ্টর এবং মস্তুল পেশী সরাসরি এক্সিটেন্ড করে এর ক্রিয়া অদর্শ করে থাকে। পাইলোকারপিন আইরিশ সংকোচন করার মাধ্যমে মায়োসিস তৈরি করে থাকে, যা কিনা ক্ষেত্রে উপর চাপ বৃদ্ধি করে এবং ট্রাবেকুলার মেসওয়াক খুলে দেয় যাতে একোয়াস রিউমার নির্গমন আরো ত্বরিত হয়।

### উপাদান

পাইলোমা® ওএসডি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতি মিলি-এ আছে পাইলোকারপিন হাইড্রোক্লোরাইড ইটএসপি ২০ মিলি।

### নির্দেশনা

ক্লোসড অ্যান্ডেল ঘুকোমা এবং মায়োসিস।

### মাত্রা ও প্রয়োগ

আক্রান্ত চোখে ১ অথবা ২ মেঁটা করে ৬ ঘণ্টা অন্তর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারী ব্যবহার্য।

### বিপর্দ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না)

কেন তথ্য পাওয়া যায়নি।

### পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

কেন তথ্য পাওয়া যায়নি।

### গর্ভবত্স্থ ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

প্রেগন্যাসি ক্যাটগরি সি। মাতৃদুর্ঘের সাথে নিম্নলিখিত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

### সতর্কতা

চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে চোখের প্রেসার পরিমাপ করা উচিত।

### অন্য ওয়ুদ্ধের সাথে প্রতিক্রিয়া

একাধিক মায়োটিক ওয়ুধ একসাথে দেয়া ঠিক নয় কারণ তাতে ওয়ুদ্ধের ক্রিয়া বেড়ে যায় অথবা উভয় ওয়ুদ্ধের ক্রিয়া কমে যায়। যদি একাধিক চোখের ওয়ুধ ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ মিনিটের ব্যবধানে ব্যবহার করা উচিত।

### মাত্রাবিক্র্য

যদি মাত্রাবিক্র্য ঘটে, তাহলে এন্টিকোলিনার্জিক হেমন- এন্ট্রোপিন ব্যবহার করতে হবে।

### সংরক্ষণ

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫°C সে. তাপমাত্রার নিচে এবং শুক্রহানে রাখুন। রেফিজারেটরে রাখবেন না। ড্রপারের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না কারণ তা সাসানেশনকে দূষিত করতে পারে। প্রথম খোলার দুই মাস পর ওয়ুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

### উপস্থাপনা

পাইলোমা® ওএসডি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতিটি ওএসডি বোতলে আছে জীবাণুমুক্ত ১০ মিলি চোখের ড্রপস।

### প্রয়োগপদ্ধতি



**Opsonin**  
Opsonin Pharma  
Ideas for healthcare

Manufactured by  
**Opsonin Pharma Limited**  
Rupatali, Barishal, Bangladesh.  
® Registered Trade Mark.