

Opatin® Max Sterile Eye Drops

Olopatadine 0.7%

Description

Olopatadine is a sterile eye drops which is a selective H₁ receptor antagonist and mast cell stabilizer.

Mode of action

Olopatadine selectively blocks histamine H₁ receptor and stabilizes mast cells. Thus it prevents histamine bonding to its receptors and inhibits mast cell degranulation & histamine release.

Composition

Opatin® Max Sterile Eye Drops: Each ml contains Olopatadine Hydrochloride USP 7.77 mg equivalent to Olopatadine 7 mg.

Indications

Ocular itching associated with allergic conjunctivitis.

Dosage & administration

Opatin® Max sterile eye drops: One drop in the affected eye(s) once a day or as directed by the physician.

Contraindications

It is contraindicated in persons with a known hypersensitivity to any component of this product.

Side effects

Blurred vision, dry eye, superficial punctate keratitis, dysgeusia and abnormal sensation in eye in 2-5% of patients.

Use in pregnancy & lactation

There is no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Therefore, this drug should be used in pregnant women only if the potential benefit to the mother justifies the potential risk to the fetus. It is not known if this medicine passes into breast milk.

Precautions

Patients should be advised not to wear contact lenses during treatment with Olopatadine ophthalmic solution. The treatment should also be discontinued in the presence of an allergic reaction.

Drug interactions

No data found.

Over dosage

No data found.

Storage

Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25°C temperature and protected from light. Do not freeze. Do not touch dropper tip to any surface as this may contaminate this preparation. Do not use after one month of first opening.

Packaging

Opatin® Max Sterile Eye Drops: Each dropper bottle contains 5 ml sterile eye drops.

অপাটিন® ম্যাক্স জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস

অলোপ্যাটাইডিন ০.৭%

বিবরণ

অলোপ্যাটাইডিন একটি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস, যা সিলেকটিভ এইচ১ রিসেপ্টর বিবেচী এবং মাস্ট সেল স্ট্যাবিলাইজার।

কার্যপদ্ধতি

অলোপ্যাটাইডিন হিস্টামিন এইচ১ রিসেপ্টর প্রতিরোধক এবং মাস্ট সেল স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে কাজ করে। এভাবে অলোপ্যাটাইডিন হিস্টামিনকে এর রিসেপ্টরে সংযুক্ত হতে বাধা দেয় এবং মাস্ট সেল ডিহায়নলেশন ও হিস্টামিন নিসেপ্রে বাধা দেয়।

উপাদান

অপাটিন® ম্যাক্স জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতি মিলিলিটে রয়েছে অলোপ্যাটাইডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ০.৭৭ মিলি মি. অলোপ্যাটাইডিন এর সমতুল্য।

নির্দেশনা

অলারাঞ্জিক কনজাংফিউটিসজনিট চোখের চুলকনি।

মাত্রা ও প্রয়োগ

অপাটিন® ম্যাক্স জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রাণ বয়স ও শিশুদের ক্ষেত্রে: অক্রান্ত চোখ ১ কোঠা করে দিনে ১ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসৰি ব্যবহার।

ব্যবহার ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না)

এই গুরুতর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

২-৫% রোগীর ক্ষেত্রে বাপসা দৃষ্টি, ওক চোখ, কর্ণিয়ার উপরি ভাগে প্রাদাহ, দাদের সমস্যা এবং চোখের অস্থি দেখা দিতে পারে।

গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভবত্তা মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ ও সুনিয়াত্তি গবেষণা করা হয়নি। ক্ষণের সমাব্য ক্ষতির তুলনায় গর্ভবত্তা মায়ের সমাব্য উপকারিতা বিবেচনা করে ব্যবহার করা উচিত।

স্তন্যদানকালে ব্যবহার: মাতৃদূষকে অলোপ্যাটাইডিন নিষ্পত্ত হয় কিনা তা জানা যায়নি। তবে স্তন্যদানকালে অলোপ্যাটাইডিন ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

সতর্কতা

অলোপ্যাটাইডিন এর চিকিৎসাকালীন সময়ে রোগীদের কনটাষ্ট লেস ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি কোন অলারাঞ্জিক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তাহলে চিকিৎসা বৃক্ষ করে দেয়া উচিত।

অন্য গুরুতর সাথে প্রতিক্রিয়া

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মাত্রাধিক

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংরক্ষণ

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। অলো থেকে দূরে, ২৫°C। তাপমাত্রার নিচে এবং স্বচ্ছতারে রাখুন। ব্রেক্টিজারেটেরে রাখবেন না। ড্রপারের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না, কারণ তা দ্রবণকে দূষিত করতে পারে। ড্রপারের মুখ খোলা একমাস পর গুরুধূটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

উপরাংশনা

অপাটিন® ম্যাক্স জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতিটি ড্রপ বোতলে আছে ৫ মিলি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস।


Opsonin
Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.