

Clobecort®

Clobetasone Butyrate BP 0.05%

Description: Clobecort® (Clobetasone Butyrate 0.05%) is a corticosteroid used in dermatology for treating such skin inflammation as seen in eczema, psoriasis and other forms of dermatitis.

Mode of Action: Clobetasone Butyrate 0.05% is a topically active corticosteroid which provides an exceptional combination of activity and safety. It is more effective in the treatment of eczemas than 1% Hydrocortisone or the less active synthetic steroid preparations that are in common use. It has little effect on hypothalamic-pituitary-adrenal function.

Composition

Clobecort® Cream: Each gm cream contains 0.5 mg Clobetasone Butyrate BP.

Clobecort® Ointment: Each gm ointment contains 0.5 mg Clobetasone Butyrate BP.

Indication: Clobecort® preparations are indicated for the treatment of eczema and dermatitis of all types including atopic eczema, photodermatitis, otitis externa, primary irritant allergic dermatitis (including napkin rash), intertrigo, prurigo nodularis, seborrhoeic dermatitis and insect bite reactions. Clobecort® may be used as a maintenance therapy between courses of one of the more active topical steroids.

Dosage and administration: Apply Clobecort® to the affected area up to four times a day until improvement occurs, then the frequency of application may be reduced.

Contraindication: Skin lesions caused by infection with viruses (e.g. herpes simplex, chicken pox), fungi (e.g. candidiasis, tinea) or bacteria (e.g. impetigo), hypersensitivity to the preparations.

Side effect: In the unlikely event of signs of hypersensitivity appearing, application should be stopped immediately. When large areas of the body are being treated with Clobetasone Butyrate 0.05%, it is possible that some patients will absorb sufficient steroid to cause transient adrenal suppression despite the low degree of systemic activity associated with Clobetasone Butyrate 0.05%. There are reports of pigmentation changes and hypertrichosis with topical steroids.

Use in pregnancy and lactation: There is inadequate evidence of safety in human pregnancy. Topical administration of corticosteroids to pregnant animals can cause abnormalities of fetal development including cleft palate and intrauterine growth retardation. There may therefore be a very small risk of such effects in the human fetus.

Precaution: Extreme caution is required in napkin eruption (as the napkin may act as an occlusive dressing and increase absorption) and treatment should not normally exceed seven days. Appropriate antimicrobial therapy should be used whenever treating inflammatory lesions which have been infected. Any spread of infection requires withdrawal of topical corticosteroid therapy and systemic administration of antimicrobial agents. As with all corticosteroids, prolonged application to the face is undesirable. If applied to the eyelids, care is needed to ensure that the preparation does not enter the eye as glaucoma might result.

Drug interaction: There have no available data of potentially hazardous interactions been reported.

Overdose: Acute overdosage is very unlikely to occur, in the case of chronic use.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25°C temperature and protected from light.

Packing

Clobecort® Cream: Each carton has a tube containing 25 gm cream.

Clobecort® Ointment: Each carton has a tube containing 25 gm ointment.

ক্লোবিকট®

ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট বিপি ০.০৫%

বর্মন: ক্লোবিকট® (ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট ০.০৫%) একটি কর্টিকোস্টেরয়েড যা একজিমা, সোরিয়াসিস এবং অন্যান্য চর্মরোগের প্রাদাহ চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কার্যপ্রক্রিয়া: ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট ০.০৫% একটি ত্বকে সক্রিয় কর্টিকোস্টেরয়েড যা কার্যকারিতা এবং সুরক্ষার একটি বার্তিমান সময়সূচী সরবরাহ করে। এটি ১% হাইড্রোকোটিসন বা কম সক্রিয় সিস্টেটিক স্টেরয়েডের চেয়ে একজিমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর। হাইপোথালামিক-পিটুইটারি-অ্যাড্রেনাল ফার্শেনে এটির খুব কম প্রভাব রয়েছে।

উপাদান

ক্লোবিকট® ক্রিম: প্রতি গ্রাম ক্রিমে আছে ০.৫ মিলি ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট বিপি।

ক্লোবিকট® অয়েক্টমেন্ট: প্রতি গ্রাম অয়েক্টমেন্টে আছে ০.৫ মিলি ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট বিপি।

নির্বাচন: ক্লোবিকট® এটেপিক একজিমা, ফিটোডার্মাইটিস, পটাইটিস এবং রাইটুর্সা, প্রথমিক ইলিয়াস্ট আলার্জিক ডার্মাটাইটিস (নায়পকিক ফুরুরুভিসেস), ইন্টারটিপিস, ফ্রারিগো নোড্রুলিস, সেবোরিক কার্মার্স সকল ধরণের একজিমা এবং চর্মরোগের চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত। ক্লোবিকট® কে অধিক শক্তিশালী স্টেরয়েডগুলির রক্ষণাবেক্ষণ থেরাপি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাত্রা ও ব্যবহার: উন্নতি না হওয়া পর্যবেক্ষণে আজ্ঞান্ত ছানে ক্লোবিকট® ক্রিম বা অয়েক্টমেন্ট দিনে চারবার করে প্রয়োগ করতে হবে, তারপর পর্যায়ক্রমে ওরুধ প্রয়োগ করতে হবে।

বিরুদ্ধ ব্যবহার: (মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): ভাইরাসের সংক্রমণিত ত্বকের সংক্রমণ (যেমন- হার্পিস সিমপেক্স, চিমেন পোর), ছাঁকাক সংক্রমণ (যেমন- ক্যার্যারিয়াসিস, চিমিয়া) বা ব্যাকটেরিয়া (যেমন- ইমপটিগো) এবং এ ওয়ুবের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া: হাইপারসেন্সিটিভির লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরে এটির ব্যবহারে অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। যখন শরীরের বৃহস্পতির অংশে ক্লোবিটাসন বিউটাইরেট ০.০৫% দিয়ে চিরিক্ষা করা হয়, তখন এটি সম্ভব যে ক্লোবিটাসন বিউটাইরেটে ০.০৫% এর মাত্রা কম থাকা সত্ত্বেও কিছু মৌলি ক্ষুণ্ণায়া আল্ড্রিনেল দমন করার জন্য পর্যাপ্ত স্টেরয়েড হ্রাস করতে পারে। টিপিক্যাল স্টেরয়েডের সাথে পিপ্পামেটেশন পরিবর্তন এবং হাইপারট্রিকোসিস ঘটতে পারে।

গৰ্ভাবস্থা এবং স্তুদনকালে ব্যবহার: মানুষের গৰ্ভাবস্থায় সুরক্ষার অপ্রতুল প্রমাণ রয়েছে। গৰ্ভবতী প্রাণীতে কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রয়োগের ফলে ভূমির বিকাশের অভিভাবিক দেখা দিতে পারে যেমন-ক্লেইট প্যালেট এবং ইন্ট্রাইটেনিন বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া।

ক্ষতি মানব ভূগ্রে এ জাতীয় অভাব খুব সামান্য আছে।
স্বাধাৰণা: নায়পকিন এপ্রেসশনে ক্ষেত্রে চৰণ স্বাধাৰণা প্রয়োজন। (কোণ নায়পকিন অনুসূচিত ডেসি হিসাবে কাজ কৰতে পারে এবং শোণ বাড়িয়ে দিতে পারে) এবং চিরিক্ষা সাধাৰণত সাত দিনের বেশি হওয়া উচিত নয়। যখন প্রদাহে সংক্রমণ হয় তখন উপরুক্ত একটিমাইক্রোবিয়াল মেরাপি ব্যবহৰ কৰা উচিত। সংক্রমণের প্রসাৰণ ঘটলে তপিক্যাল কর্টিকোস্টেরয়েড থেরাপি প্রয়োগ কৰা দৰকার এবং সিস্টেমিক আল্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট দিতে হবে। সম্ভূত কর্টিকোস্টেরয়েড চেহারার দীর্ঘদিন প্রয়োগ থেকে বিৰত থাকতে হবে। যদি চেহারের পাতায় প্রয়োগ কৰা হয় তবে যেহেতু সতৰ্কতাৰ সাথে কৰতে হবে যেন চোখে প্ৰৱেশ না কৰে কোৱ গুুকোমা হতে পারে।

অন্য ওয়ুবের সাথে ত্বকে: মানুষাক দ্রষ্টিকৰণ প্রতিক্রিয়া হওয়াৰ সম্ভাৱনা খুব কম।

মাত্রাধিক্য: ক্লোবিকট® ক্রিম: প্রতিটি কার্টনে একটি টিউবে আছে ২৫ গ্রাম ক্রিম।

ক্লোবিকট® অয়েক্টমেন্ট: প্রতিটি কার্টনে একটি টিউবে আছে ২৫ গ্রাম অয়েক্টমেন্ট।

0727-01



Opsonin
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.