

Precodil®

Sterile Ophthalmic Suspension

Prednisolone USP 1%

Description: Prednisolone Acetate is the acetate salt form of prednisolone, a synthetic glucocorticoid.

Mode of action: Prednisolone decreases inflammation by inhibiting the synthesis of prostaglandin and other inflammatory mediator through suppressing phospholipase A2.

Composition: **Precodil® Sterile Ophthalmic Suspension:** Each ml contains Prednisolone Acetate USP 10 mg.

Indications: steroid-responsive inflammation of the palpebral and bulbar conjunctiva, cornea, and anterior segment of the globe.

Dosage & administration: 1 drop 2 to 4 times daily. During the initial 24 to 48 hours, the dosing frequency may be increased if necessary. Care should be taken not to discontinue the therapy before completing the course or as directed by the Physician.

Contraindications: Prednisolone suspension is contraindicated in acute untreated purulent ocular infections, in most viral diseases of the cornea and conjunctiva including epithelial herpes simplex keratitis (dendritic keratitis), vaccinia, and varicella, and also in mycobacterial infection of the eye and fungal diseases of ocular structures.

Side effects: No data found.

Use in pregnancy & lactation: Proper data not found. It is not known whether this drug is excreted in human milk or not.

Precautions: Fort ophthalmic use only.

Drug interactions: No data found.

Over dosage: No data found.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25° C temperature and protected from light. Do not touch dropper tip to any surface as this may contaminate this preparation. Do not use after one month of first opening.

Packaging: **Precodil® Sterile Ophthalmic Suspension:** Each dropper bottle contains 5 ml sterile ophthalmic suspension.

প্রিকোডিল®

জীবান্মুক্ত অফথালমিক সাসপেনশন

প্রেডনিসোলন ইউএসপি ১%

বিবরণ:

প্রেডনিসোলন অ্যাসিটেট হল প্রেডনিসোলনের অ্যাসিটেট সল্ট ফর্ম, যা একটি সিলিংটিক গুকোকটিকয়েড।

কার্যসম্পর্ক:

প্রেডনিসোলন প্রোটাইগ্লিন সিনথেসিস ইনহিবিট করে এবং ফসফোলাইপেস এৰু কে সাথেস করায় অন্যান্য প্রাদাহজনিত মেডিয়েটর দমন করে ফলে প্রাদাহ হ্রাস পায়।

উপাদান:

প্রিকোডিল® জীবান্মুক্ত অফথালমিক সাসপেনশন: প্রতি মিলি-এ আছে প্রেডনিসোলন অ্যাসিটেট ইউএসপি ১০ মিগ্রা।

নির্দেশনা:

পাত্রপোর্ট এবং বালবার কমজাংটিভা, কর্নিয়া এবং গ্লোবের ভেতরের অংশে স্টেটরয়েড-সংবেদনশীল প্রদাহে নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগ:

দৈনিক ২ থেকে ৪ বার ১ কোঠা করে। শুরুর ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মাঝে প্রয়োগের মাত্রা বাড়ানো মেটে পারে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যবহার।

বিকল্প ব্যবহার:

এক্স্ট্রাট অন্তিক্লিম পুরলেন্ট চোখের সংক্রমণ, কর্নিয়া এবং কমজাংটিভসহ এপিথেলিয়াল হারপিস সিমপ্রেক্স কেরাটাইটিস (চেনডাই-টিক কেরাটাইটিস), ভার্সিনিয়া এবং ভারিনেলাসহ প্রায় সকল ভাইরাল রোগে এবং চোখের মাইকোবাক্টেরিয়াল সংক্রমণ এবং চোখের মে কোন অংশের ফাংগাল সংক্রমণে প্রেডনিসোলন সাসপেনশন প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

গভৰ্নেশন ও স্টন্ডার্নকালে ব্যবহার:

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। মাত্রনুন্দের সাথে নিঃসরিত হয় কিনা জানা যায়নি।

সতর্কতা:

শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মাত্রাবিক্রিক:

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংরক্ষণ:

শিল্পদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫° সে. তাপমাত্রার নিচে এবং শুক্রান্তে রাখুন। রেফিজারেটরে রাখাবেন না। ড্রপারের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না, কারণ তা দ্রবণকে দূষিত করতে পারে। প্রথম খেলার এক মাস পর ওয়্যার্টি ব্যবহার করা উচিত নয়।

উপচাপনা:

প্রিকোডিল® জীবান্মুক্ত অফথালমিক সাসপেনশন: প্রতিটি ড্রপার বোতলে আছে ৫ মিল জীবান্মুক্ত চোখের ড্রপস।



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.