

Spotex®

Tretinoin USP 0.1%

Description: Spotex® is a topical stretch marks removing cream which is a preparation of Tretinoin.

Mode of action: Tretinoin is a retinoid that has been shown to regulate cell reproduction, proliferation, and differentiation. It also reduces the cohesiveness and increases the turnover of follicular epithelial cells.

Composition: Spotex® Cream: Each gram cream contains Tretinoin USP 1 mg.

Indications: Spotex® Cream is indicated for the treatment of Pregnancy-Related Abdominal Striae (Stretch Marks). It is also indicated for the topical treatment of acne vulgaris, mottled hyperpigmentation, photo damaged skin, flat warts and other skin conditions eg- ichyosis vulgaris, keratosis follicularis.

Dosage & administration:



Take pea amount of cream on finger tip



Apply thinly on the affected area



Wash 2 hr. after application for first 2 weeks and then keep it over night



Use moisturizer if the skin become dry



Avoid harsh soap or lime on the affected skin

Contraindications: Patients who have hypersensitivity to Tretinoin, this cream is contraindicated for those patients.

Side effects: Some mild side effects may be shown like- erythema, itching, burning & dry skin.

Use in pregnancy & lactation: Application of Tretinoin is not safe during pregnancy. It is not known whether Tretinoin is excreted in human milk.

Precautions:

1. This product is only for external application. After apply avoid exposure to sunlight.
2. Use after one or two nights in case of excessive burning.
3. It is not recommended to use below 12 years of age.

Drug interactions: Tretinoin may not work properly or skin irritation might occur if it is used with any other skin product containing a peeling agent (eg, benzoyl peroxide, resorcinol, salicylic acid or sulfur).

Overdose: Use of excess amount of this cream can lead to peeling, irritation, and excessive dryness.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 30°C temperature and protected from light.

Packaging: Spotex® Cream: Each pack has a tube containing 50 gm Cream.

স্পটেক্স®

ট্রিটিনয়িন ইউএসপি ০.১%

বিবরণ: স্পটেক্স® হলো একটি টপিক্যাল মাতৃত্বকালীন পেটের ফাটা দাগ দূর করার জীব যা ট্রিটিনয়িন-এর একটি প্রস্তুতি।

কার্যপ্রাণী: ট্রিটিনয়িন হলো একটি রেটিনয়েড যা নতুন কোষ সৃষ্টি, বৃক্ষি এবং পার্থক্যকরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ফলিকুলার এপিডেরিয়াল কোবের সংযুক্ত হাস করে এবং টার্নেক্সের বাড়ায়।

উপাদান: স্পটেক্স® জীব: প্রতি গ্রাম জীব থাকে ট্রিটিনয়িন ইউএসপি ১ মিলিগ্রাম।

নির্দেশনা: স্পটেক্স® জীব গর্ভবত্ত্বায় পেটের ফাটা দাগ (টেক্ট মার্কস) এর চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত হয়। এটি ব্রণ, অতিরিক্ত কালো দাগ, আঁচিল এবং অন্যান্য তুকের অবস্থার জন্যও নির্দেশিত হয় যেমন- ইকথাইওসিস ভালগারিস, কেরাটোসিস ফলিকুলারিস।

মাত্রা ও প্রয়োগ:



আঙ্গুলের ডগায় মতো
দানার পরিমাণে ক্রিম
নিন।



আক্রান্ত তুকে পাতলা
আবরণের মত প্রয়োগ
করুন।



প্রথম দুই সপ্তাহ প্রতি
রাতে প্রয়োগের ২
শপ্তি প্রথম ধূয়ে ফেলুন
ও পরবর্তীতে সারারাত



তুক ওক হয়ে গেলে
ময়েগারাইজার
ব্যবহার করুন।



আক্রান্ত তুকে সাবান
বা দেনুর খেসার স্পর্শ
এড়িয়ে চলুন।

বিরুদ্ধ ব্যবহার: যে রোগীদের ট্রিটিনয়িন-এর প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা আছে, এই জীব সেই রোগীদের জন্য প্রতিনির্দেশিত।

পর্যাপ্তি-প্রতিরিক্ষা: কিছু হালকা পার্শ্বপ্রতিরিক্ষা দেখা যেতে পারে যেমন- লালচে তুক, চুলকানি, জ্বালাপোড়া এবং
শুক তুক।

গর্ভবত্ত্ব ও স্ন্যাদানকালে ব্যবহার: গর্ভবত্ত্বায় ট্রিটিনয়িন প্রয়োগ করা নিরাপদ নয়। মাতৃদুর্ঘট ট্রিটিনয়িন নির্গত
হয় কিন্তু তা জানা যায়নি।

সতর্কতা:

১. এই প্রয়োগ শুধুমাত্র বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য। জীব ব্যবহারের পর সূর্যোলাকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
২. ব্যবহারের পর যদি অতিরিক্ত জ্বালাপোড়া করে তাহলে এক বা দুই রাত পর পর ব্যবহার করুন।
৩. ১২ বছরের কম বয়সীদের জন্য নির্দেশিত নয়।

অন্য ওয়্যবের সাথে ব্যবহার: ট্রিটিনয়িন পিলিং এজেন্ট (যেমন, বেনজয়েল পারাজাইড, রেসোরাসিমোল, স্যালিসিলিক অ্যাসিড বা সালফার) ধারণকারী অন্য কোন তুকের ওয়্যবের সাথে ব্যবহার করলে সঠিকভাবে কাজ
নাও করতে পারে বা তুকের জ্বালা হতে পারে।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে এবং শুক্রহনে রাখুন।

উপস্থিতি: স্পটেক্স® জীব: প্রতিটি প্যাকে একটি চিউবে আছে ৫০ গ্রাম জীব।

1030-01


Opsonin
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatalli, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.