

Trapost® OSD Eye Drops

Travoprost 0.004%

Description

Travoprost, a prostaglandin analogue, is effective to reduce elevated intraocular pressure (IOP).

Composition

Trapost® OSD Sterile Eye Drops: Each ml sterile eye drops contains Travoprost USP 0.04 mg.

Preservative: Free.

Indications

Indicated for the reduction of elevated intraocular pressure in patients with open-angle glaucoma or angle closure glaucoma.

Dosage & administration

The recommended dose is one drops in the conjunctival sac of the affected eye (s) once daily in the evening. If more than one topical ophthalmic product is being used, the medicines must be administered at least 5 minutes apart.

Contraindications

Travoprost eye drops are contraindicated in patients with hypersensitive to travoprost or any excipients of this preparation.

Side effects

The most frequently reported treatment related side effect is ocular hyperaemia.

Use in pregnancy & lactation

Pregnancy category C. It is unknown whether travoprost eye drops is excreted in human breast milk. The use of travoprost by breast-feeding mothers is not recommended.

Precautions

Travoprost may cause changes to pigmented tissues.

Drug interactions

No specific interaction was observed with travoprost eye drops.

Over dosage

No cases of overdose have been reported.


Storage

Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25°C temperature and protected from light. Do not touch the dropper tip to surfaces since this may contaminate the solution. Do not use after 2 months of first opening.

Packaging

Trapost® OSD Sterile Eye Drops: Each dropper bottle contains 3 ml sterile eye drops.

Application Process



ট্রাপোস্ট® ওএসডি চোখের ড্রপস

ট্রাভোপ্রোস্ট ০.০০৪%

বিবরণ

ট্রাভোপ্রোস্ট হল প্রোস্টাগ্লান্ডিনের এ্যানালগ যা বর্ধিত ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার হ্রাস করে।

উপাদান

ট্রাপোস্ট® ওএসডি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: চোখে ব্যবহার উপযোগী প্রতি মিলি জীবাণুমুক্ত দ্রবণে আছে ট্রাভোপ্রোস্ট ইউএসপি ০.০৪ মিলি।
প্রিজারেটিভ: মুক্ত।

নির্দেশনা

ওপেন-আপেল অথবা অ্যাপেল ক্লোজার প্লাকোমাজনিত চোখের বর্ধিত ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার কমাতে নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগ

প্রতি সঞ্চায় এক ফেটাটা করে চোখে দিতে হবে। দুইয়ের অধিক চোখের ওযুথ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের বিবরণ দিয়ে বাকী ওযুথগুলো ব্যবহার করতে হবে।

বিরুদ্ধ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না)

ট্রাভোপ্রোস্ট অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্বক্রিয়া

চোখে হাইপারেমিয়া হতে পারে।

গর্ভবত্ব ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

প্রেগনেন্সি ক্যাটগরোরি সি। ট্রাভোপ্রোস্ট মাতৃদুষ্টে নিঃস্তৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি তবে স্তন্যদানকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে ট্রাভোপ্রোস্ট ব্যবহার করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

সর্তর্কতা

চোখের টিস্যুকে পিগমেন্টেড করতে পারে।

অন্য ওযুথের সাথে প্রতিক্রিয়া: চোখের দ্রবণ হিসেবে ট্রাভোপ্রোস্ট এর নির্দিষ্ট কোন ওযুথ আন্তঃক্রিয়া প্রমাণিত হয়েনি।

মাত্রাধিক্য: মাত্রাধিক্যের ব্যাপারে জানা যায়নি।

সংরক্ষণ

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫°সি. তাপমাত্রার নিচে এবং ওক্সানে রাখুন। ড্রপারের উপরিভাগ শৰ্প করবেন না কারণ তা সলাশনকে সৃষ্টি করতে পারে। প্রথম খেলার দুই মাসের মধ্যেই ওযুথটি ব্যবহার করতে হবে।

উপস্থাপনা

ট্রাপোস্ট® ওএসডি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতিটি ড্রপার বোতলে আছে জীবাণুমুক্ত ৩ মিলি চোখের ড্রপস।

প্রয়োগসম্বিতি



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
© Registered Trade Mark.



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
© Registered Trade Mark.

০৯১৪০২