

Visral®

Tiemonium Methylsulphate INN

Description: Tiemonium Methylsulphate (Visral®) is an antispasmodic drug. It reduces the muscle spasm of the intestine, biliary system, bladder and uterus.

Mode of action: Tiemonium Methylsulphate (Visral®) rapidly relieves spastic condition through the inhibition of intracellular proteins by competitively antagonising acetylcholine and histamine and stabilizing the cell membrane by strengthening calcium bonding with membrane phospholipids and proteins.

Pharmacokinetics: Tiemonium Methylsulphate (Visral®) is readily absorbed from the gastrointestinal tract. It is rapidly cleared from the blood and is distributed throughout the body. It is incompletely metabolized in the liver and is excreted in the urine as unchanged drug and metabolites. A half-life of about 4 hours has been reported.

Composition

Visral® Tablet: Each film-coated tablet contains Tiemonium Methylsulphate INN 50 mg.

Visral® Injection: Each 2 ml injection contains Tiemonium Methylsulphate INN 5 mg.

Visral® 50 ml Syrup: Each 5 ml contains Tiemonium Methylsulphate INN 10 mg.

Visral® 100 ml Syrup: Each 5 ml contains Tiemonium Methylsulphate INN 10 mg.

Visral® 20 mg Suppository: Each suppository contains Tiemonium Methylsulphate INN 20 mg.

Indications: Visral® is indicated for the treatment of spasm of the intestine, biliary system, bladder and uterus.

Dosage & Administration

Tablet: The usual dose is 2 to 6 tablets (100 mg – 300 mg) per day in divided doses as required.

Injection: The usual dose is 5 mg (1 ampoule) by slow IM or IV injection 3 times per day.

Syrup: Adult: 5-15 ml three times daily

Children: 3 ml / kg body weight daily in 3 divided doses.

≥10 kg. wt. baby- 2 tea spoonful 3 times daily.

≥15 kg. wt. baby- 3 tea spoonful 3 times daily.

Suppository: Adults: The usual dosage is 1-2 (20-40 mg) suppositories per day.

Contraindication: The drug should not be used in glaucoma (acute pain of eyeball with vision disturbances), difficulty to urinate (disorders of prostate or bladder), tachycardia, myocardial infarction, pyloric stenosis and acute edema of the lung.

Side Effects: Side effects include dryness of mouth with difficulty in swallowing & thirst, difficulty with micturition and constipation, risk of hypotension & tachycardia, occasional retention of urine in excessive or overdoses.

Use in pregnancy and lactation: It is better to avoid taking the drug during pregnancy or breast-feeding.

Precautions: Caution should be taken in cases of chronic bronchitis, coronary insufficiency, ambient hyperthermia, renal insufficiency and hepatic insufficiency.

Drug interactions: The effects of Tiemonium may be enhanced by the concomitant use of other drugs with antimuscarinic properties, such as amantadine, some antihistamines, phenothiazine antipsychotics and tricyclic antidepressants.

Over dosage: In over dosage, no data is available in case of Tiemonium Methylsulphate.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25°C temperature and protected from light.

Packaging: Visral® Tablet: Each carton contains 10X5 tablets in blister pack.

Visral® Injection: Each carton contains 5X2 ampoules of 2 ml in blister pack.

Visral® 50 ml Syrup: Each carton contains a bottle having 50 ml syrup.

Visral® 100 ml Syrup: Each carton contains a bottle having 100 ml syrup.

Visral® Suppository: Each carton contains 5X2 suppositories in blister pack.

ভিসরাল®

টাইমোনিয়াম মিথাইল সালফেট আইএনএন

বিবরণ: টাইমোনিয়াম মিথাইল সালফেট (ভিসরাল®) একটি এন্টিপায়োমোডিক ঔষধ। এটি সুদ্রান্ত, বিলিয়ারি সিটেম, রাত্তর এবং জরায়ুর মাংসপেশীর সংকোচন হারে।

কার্যপদ্ধতি: টাইমোনিয়াম মিথাইল সালফেট (ভিসরাল®) খুব দ্রুত সুদ্রান্ত, বিলিয়ারি সিটেম এবং জরায়ুর স্পাজম কমায়। এটি প্রতিগ্রাহিত মূলভাবে এসব জাগতার প্রেটিনের সাথে এসিটাইলকোলিন ও হিস্টামিনের বৰ্কনে বাধা প্রদানের মাধ্যমে এবং কোষ প্রাচীন ফসফলিপিন ও প্রেটিনের সাথে কালসিমাইনের বৰ্কনে শক্তিশালী করার মাধ্যমে কোষ প্রাচীরক স্থিতিবস্থায় রাখে।

ওষুধের উপর শরীরের ক্ষেত্রে (ফার্মাকোইনসিট্রিক্স): টাইমোনিয়াম মিথাইল সালফেট (ভিসরাল®) পরিপাকত্ব হতে দ্রুত শোষিত হয়। এটি দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে যায়। ব্যক্ত এবং পিপাক অস্পষ্টভাবে সংষ্টিত হয় এবং মুক্তের মাধ্যমে অগ্রিবর্তিত অবস্থায় ও মেটাবোলিটিক হিসেবেও নিঃস্বার্থ হয়। এর অর্ধেক প্রায় ৪ ঘণ্টা।

উপাদান

ভিসরাল® ট্যাবলেট: প্রতি ফিল্ম-কোটেড ট্যাবলেটে আছে টাইমোনিয়াম মিথাইল সালফেট আইএনএন ৫০ মিশ্র।

ভিসরাল® ইনজেকশন: প্রতি ৫ মিলি সিরাপ: প্রতি মিলি সিরাপে আছে টাইমোনিয়াম মিথাইল সালফেট আইএনএন ২ মিশ্র।

ভিসরাল® ১০০ মিলি সিরাপ: প্রতি মিলি সিরাপে আছে টাইমোনিয়াম মিথাইল সালফেট আইএনএন ২ মিশ্র।

ভিসরাল® ২০ মিশ্র সাপোজিট্রোই: প্রতি সাপোজিট্রোই আছে টাইমোনিয়াম মিথাইল সালফেট আইএনএন ২০ মিশ্র।

নির্দেশনা: এটি সুদ্রান্ত, বিলিয়ারি সিটেম, রাত্তর ও জরায়ুর স্পাজমের বা সংকোচনের চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগ

ট্যাবলেট: সারারক সৈনিক ২-৬টি ট্যাবলেট (১০০-৩০০ মিশ্র) ব্রিক্স মাত্রায়, প্রয়োজন অনুযায়ী সেব্য।

ইনজেকশন: ধীরগতিতে মাংসপেশী বা শিরাপথে ১টি এ্যাম্পুল (৫ মিশ্র) দিনে ৩ বার দেয়া যেতে পারে।

সিরাপ: শারীরক ওজন: ৫-৫ মিলি সিরাপে তিন বার।

শিশু: প্রতিক্রিয়া দেখিব ওজন: ২ চামচ করে দিনে তিন বার।

১১০ কেজি দেখিব ওজন: ২ চামচ করে দিনে তিন বার।

১১৫ কেজি দেখিব ওজন: ৩ চামচ করে দিনে তিন বার।

সাপোজিট্রোই: প্রাণী: পিণ্ড ১ - ২ মিলি (২০-৪০ মিশ্র) সাপোজিট্রোই।

বিক্রিক ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): এ ঔষধটি গুরুতর আক্ষিগোলের তীব্র ব্যাথা ও দৃষ্টি জটিলতা, মুক্ত নিগমনে জটিলতা (গ্রোটেড গ্ল্যান্ড ও মূরগিকর্তৃর জটিলতা), দ্রুত হৃদস্পন্দন, মায়োকার্টিয়াল ইনফার্কশন, পাইলোরিক স্টেনোসিস এবং ফসফুসের তীব্র ইতিমাল দেখাবে না।

পার্শ্ব ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): এ ঔষধটি গুরুতর আক্ষিগোলের তীব্র ব্যাথা ও দৃষ্টি জটিলতা, মুক্ত নিগমনে সমস্যা, কোষ্টকাটিন, নির্মাণ ক্ষতিপ্রদ ও দ্রুত হৃদস্পন্দনের ঝুঁকি।

গুরুবর্ষা ও স্তনদানকালে ব্যবহার: চিকিৎসকের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ছাড়া গুরুবর্ষা ও স্তনদানকালীন এ ঔষধ কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়।

সতর্কতা: ব্রুকেস, সীর্ধকালীন প্রদাহ, করোনারি প্রদাহ, যকৃত ও বৃক্ত জটিলতায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এমানটার্ডিন, এক্টিহিস্টিমিন, ফেনথায়াজিন, এস্টিমাইকটেক্টিক ও ট্রাইস্টেরিনিক এস্টিভিপ্রেসেন্ট- এসব ঔষুধের মেহেত এক্টিমাসক্রিনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই একটে সেবনে টাইমোনিয়াম - এর দ্বিতীয় বৃক্তি পায়।

মাত্রাবিক্রিয়া: টাইমোনিয়ামের মাত্রাবিক্রিয়ের তেমন ক্ষেত্র থাকে যায়নি।

সংরক্ষণ: স্বাধীনের নাগাদের বাইরে রাখুন। আগো থেকে দূরে, ২৫°C, তাপমাত্রার নিচে এবং পক্ষস্থানে রাখুন।

উপস্থাপনা

ভিসরাল® ট্যাবলেট: প্রতি কার্টেন ক্ষিটের স্তোপে আছে ১০X৫ ট্যাবলেট।

ভিসরাল® ইনজেকশন: প্রতি কার্টেন ক্ষিটের স্তোপে আছে ৫X২ এ্যাম্পুল।

ভিসরাল® ৫০ মিলি সিরাপ: প্রতি কার্টেন ক্ষিটের স্তোপে আছে ৫X১ মিলি সিরাপ।

ভিসরাল® ১০০ মিলি সিরাপ: প্রতি কার্টেন ক্ষিটের স্তোপে আছে ১০X১ মিলি সিরাপ।

ভিসরাল® ২০ মিশ্র সাপোজিট্রোই: প্রতি কার্টেন ক্ষিটের স্তোপে আছে ৫X২ সাপোজিট্রোই।

08320

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.

