

Flatulex®

Simethicone USP

Description

Simethicone (Flatulex®) is used as an antiflatulent to relieve symptoms commonly referred to gas including upper GI bloating pressure, fullness or stuffed feeling. The clinical use of Simethicone is based on its antifoam properties.

Mode of action

Simethicone (Flatulex®) acts in the stomach and intestines to change the surface tension of gas bubbles, enabling them to coalesce, thus gas is freed and eliminated more easily by belching or passing flatus.

Pharmacokinetics

Not absorbed from the gut.

Composition

Flatulex® 15 ml Pediatric Drops: Each ml drop contains simethicone USP 67 mg.

Indications

1. Flatulence, abdominal distention, fullness gas and windy colic
Flatulex® is an excellent and effective antiflatulent. It is used for relief of the painful symptoms of excess gas in the digestive tract. Such gas is frequently caused by excessive swallowing of air or by eating foods that disagree. Simethicone drop is especially used in infants, acts in the stomach and intestines. The Simethicone enables freeing and eliminating the gas more easily by belching or passing flatus.

2. Large bowel preparation

Addition of Simethicone to a polyethylene glycol bowel preparation products symptomatic improvement prior to investigation in patients undergoing colonoscopy.

3. Treatment of poisoning

Simethicone has an anecdotal use as an antifoaming agent in the management of accidental ingestion of foaming detergents.

Dosage & administration

Take after meals and at bedtime. Can be given with infant's feeds. Shake the bottle well before each use.

Children less than 2 years of age:

20 mg (0.3 ml Flatulex® drops) 4 times daily up to 240 mg (3.6 ml Flatulex® drops).

Children 2-12 years of age:

40 mg (0.6 ml Flatulex® drops) 4 times daily.

Adults:

40-125 mg (0.6 ml-1.9 ml Flatulex® drops) 4 times daily, up to 500 mg/day (7.5 ml Flatulex® drops).

Contraindications

Simethicone (Flatulex®) is contraindicated in patients with known hypersensitivity to simethicone.

Side effects

Simethicone is physiologically inert and no adverse effect has been noted after oral ingestion.

Use in pregnancy & lactation

Pregnant women:

No data are available to suggest any harmful effects.

Lactating mother:

Excretion of simethicone in breast milk has not been established and would be most unlikely.

Precautions

Keep the medicine out of the reach of children.

Drug interactions

There is no evidence that Simethicone modifies the effect of other drugs.

Over dosage

If overdose is suspected, contact with doctor.

Storage

Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25°C temperature and protected from light.

Packaging

Flatulex® 15 ml Pediatric Drops: Each bottle containing 15 ml drops with a plastic dropper.

ফ্লাটুলেক্স®

সিমেথিকন ইউএসপি

বিবরণ

ফ্লাটুলেক্স® (সিমেথিকন) একটি পাকহৃষ্ণী বায়ুরোধী ঔষধ। ফ্লাটুলেক্স® পাকহৃষ্ণীর অভ্যন্তরে বায়ু বা গ্যাস তৈরীর ফলে সৃষ্টি লক্ষণ সমূহ: পাকহৃষ্ণী ও অন্তরের উপরের অংশের ফাঁপাবেধ, চাপ, পেটভাব বেধ এবং খাদ্য দ্বারা পাকহৃষ্ণীর বৃক্ষতার ইত্যাদির উপর্যুক্ত করে। ফ্লাটুলেক্স® এস্টিমোর (বায়ুমেঠে বা বুদ্ধ বুদ্ধ নাশক) কার্যকারিতার জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কার্যপদ্ধতি

ফ্লাটুলেক্স® পাকহৃষ্ণী এবং অন্তরের বায়ুর বুদ্ধ বুদ্ধগুলির প্রটাইনের পরিবর্তন করে, ফলে এগুলো কেটে যায়, তখন সহজেই আবক্ষ গ্যাস মুক্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যায়ে টেক্টুরের মাধ্যমে অবক্ষ পায়ুপথ দিয়ে বের হয়ে যায়।

গুরুতরের উপর শরীরের ক্রিয়া (ফার্মাকোকাইনেটিক্স)
পাকহৃষ্ণী দিয়ে শোষিত হয় না।

উপাদান

ফ্লাটুলেক্স® ১৫ মিলি পেডিয়াট্রিক ড্রপস: প্রতি মিলি ড্রপে আছে সিমেথিকন ইউএসপি ৬৭ মিথা।

নির্দেশনা

১। পেটক্ষীপা, অন্তরের ফোলাভাব, পেটভাব, অতিক্রিক গ্যাস এবং এর ফলে সৃষ্টি বায়ু:

বায়ুরোধী হিসাবে ফ্লাটুলেক্স® এর চমৎকার কার্যকারিতা রয়েছে। এটা পরিপক্ষভাবে তৈরী হওয়া প্যাসের ফলে সৃষ্টি বায়ুর উপর্যুক্ত হয়। ফ্লাটুলেক্স® পেডিয়াট্রিক ড্রপস বিশেষভাবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

২। বৃদ্ধদ্রোগের জন্য প্রস্তুত মিশ্রণ হিসাবে:

ফ্লাটুলেক্স®-কে পলিইথিলিন গ্লাইকোলের সাথে মিশিয়ে কোলেনোকোপ পরীক্ষার পূর্বে রোগীর বৃদ্ধদ্রোগে প্রয়োগ করা যাতে পারে।

৩। বিশেষ ক্রিয়ার চিকিৎসায়:

অসাবধানতাবশত ফেনা তৈরী করে এমন টিটারজেন্ট (পরিষ্কারক) খেয়ে ফেললে, ক্ষতির ক্রিয়ার প্রতিষ্যেধক হিসাবে ফ্লাটুলেক্স® দেয়া যাবে, কারণ এর ফেনা নাশক ক্ষমতা রয়েছে।

মাত্রা ও প্রয়োগ

খাদ্য প্রহণের পর এবং ঘুমাতে যাবার পূর্বে দেয়। প্রয়োজনে বাচ্চার খাবারের সাথে মিশিয়ে দেয়া যাবে। প্রতিবার ব্যবহারের পূর্বে বেতল ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। ২. ব্যবহারের কম বয়সী শিশু: ২০ মিথা (০.৩ মিলি ফ্লাটুলেক্স® পেডিয়াট্রিক ড্রপস), দিনে ৪ বার। সর্বোচ্চ দৈনিক সেবন মাত্রা ২৪০ মিথা (০.৬ মিলি ফ্লাটুলেক্স® পেডিয়াট্রিক ড্রপস), দিনে ৪ বার।

পূর্ববয়ক: ৪০-১২৫ মিথা। ০.৬-১.৯ মিলি ফ্লাটুলেক্স® পেডিয়াট্রিক ড্রপস, দিনে ৪ বার, সর্বোচ্চ দৈনিক ৫০০ মিথা (১.৫ মিলি ফ্লাটুলেক্স® পেডিয়াট্রিক ড্রপস)।

ব্রিক্স ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না)

সিমেথিকন এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা থাকলে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সিমেথিকন শারীরিকভাবে নিঙ্কির উপাদান এবং খাওয়ার পরে এর কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

গুরুতর ব্যবহার

গুরুতর প্রতিক্রিয়া মহিলা: কোন ক্ষতিকর প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

স্তন্যদানকারী মহিলা: মাতৃত্বে সিমেথিকনের নি:সরনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সরকর্তব্য

গুরুতর শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া

সিমেথিকন অন্য ঔষধের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মাত্রাধিক্রিয়া

মাত্রাধিক্রিয়া হলে ডাঙারের সাথে যোগাযোগ করুন।

সংরক্ষণ

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫°C তাপমাত্রার নিচে এবং শুক্রান্তে রাখুন।

উপস্থাপনা

ফ্লাটুলেক্স® ১৫ মিলি পেডিয়াট্রিক ড্রপস: প্রতিটি বোতলে রয়েছে ১৫ মিলি ড্রপস প্লাস্টিক ড্রপসরস।

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.

Opsonin
Opsonin Pharma
Ideas for healthcare
® Registered Trade Mark.