

## Fentinox® VC

Fenticonazole Nitrate BP

**Description:** Fentinox® VC is a Fenticonazole preparation which is a broad-spectrum antimycotic agent with activity against dermatophytes and yeasts. Fenticonazole has also been shown to exhibit antibacterial action against bacteria and antiparasitic action against the protozoan *Trichomonas vaginalis*.


**Mode of Action:** Fenticonazole binds and inhibits ergosterol synthesis by inhibiting CYP450-dependent 14-alpha sterol demethylase. The inhibition of 14-alpha sterol demethylase results in a depletion of ergosterol in fungal cell membrane.

**Composition:** Fentinox® VC: Each gm vaginal cream contains Fenticonazole Nitrate BP 20 mg.

**Indication:** Fentinox® VC is indicated for the treatment of vulvovaginal candidiasis.

**Dosage & Administration:** For adults, the applicator should be filled with 5 gm Fentinox® VC and administered into the deep vagina in the morning and evening for three days.

**How to use Fentinox® VC:** Follow the instructions in the diagrams below—



1. Screw the applicator onto the tube in place of the cap. Squeeze the tube gently at its lower end, so as to fill the applicator. If there is a certain resistance in the piston, pull it delicately. Unless otherwise prescribed by the physician, the applicator must be completely filled.

2. Remove the applicator from the tube, which should be closed immediately with the cap.

3. In a lying down position, with knees raised and spread apart, delicately insert the applicator into the vagina as deeply as possible. Push the piston in completely, then pull out the applicator without touching the piston.

After each use, wash it carefully with warm water and soap. If your doctor advises sterilization of the applicator, for a particular reason, follow his instructions. Do not use water which is hotter than 50°C or solvents. Then dry the applicator and store in its packet. Always wash your hands with mild soap and warm water afterwards. Fentinox® VC is not greasy and can easily be removed with water.

**Contraindication:** Hypersensitivity to Fenticonazole or any component of the formulation.

**Side Effects:** After intravaginal administration, slight transient burning may occasionally occur, which usually disappears rapidly.

**Use in Pregnancy & Lactation:** Since there is no data of use during pregnancy or lactation, so Fenticonazole should not be used without physician's advice.

**Precautions:** It should not be used in conjunction with barrier contraceptives. In the event of a hypersensitivity reaction or development of resistant organisms, treatment should be discontinued and take physician consultation.

**Drug Interaction:** Since systemic absorption of Fenticonazole after vaginal application is low, interactions with other drugs are unlikely.

**Overdose:** Because of the low systemic absorption after vaginal application, overdosage is unlikely.

**Storage:** Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25° C temperature and protected from light.

**Packaging:** Fentinox® VC: Each carton has a lami tube containing 30 gm vaginal cream with an applicator.

## ফেন্টিনক্স® ভিসি

ফেন্টিকোনাজল নাইট্রেট বিপি

বিবরণ: ফেন্টিনক্স® ভিসি হল ফেন্টিকোনাজল প্রস্তুতি যা একটি শক্তিশালী ব্রড-লেপ্ট্রাইম এস্টিমাইকোটিক যা ডার্মাটোফাইটস এবং ছত্রাকের বিকলে খুবই কার্যকর। এছাড়াও ফেন্টিকোনাজল ভ্যাজাইনাল সংক্রমণের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া বিরোধী ও ট্রাইকোমোস ভ্যাজাইনালিস পরজীবীর বিকলে এন্টিপ্যারাসাইটিক কার্যক্রম দেখায়।


কার্যপদ্ধতি: ফেন্টিকোনাজল CYP450 নির্ভরশীল ১৪-আলকাল স্টেরল ডিমিথাইলেজ এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে এরগোস্টেরল সংশ্লেষণ বৃক্ষ করে দেয় যার ফলে ফাংগাসের কোষে এরগোস্টেরল এর ঘাটতি তৈরি হয়।

উপাদান: ফেন্টিনক্স® ভিসি: প্রতি গ্রাম ভ্যাজাইনাল ক্রীমে রয়েছে ফেন্টিকোনাজল নাইট্রেট বিপি ২০ মিল।


নির্দেশনা: ফেন্টিনক্স® ভিসি: ভালভোভ্যাজাইনাল ক্যান্টিডিয়াসিস চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগ: প্রাণ বয়সকন্দের ক্ষেত্রে, এপ্লিকেটরাটি ৫ গ্রাম ফেন্টিনক্স® ভিসি দ্বারা পূর্ণ করে ভ্যাজাইনার গভীরে সকাল ও সন্ধিয়া তিনি দিন প্রয়োগ করতে হবে।

ফেন্টিনক্স® ভিসি ব্যবহারের নিয়ম: নিচের ছবিগুলোর নির্দেশনাবলী অনুসরণ করুন-



১। এপ্লিকেটরাটি চিউবের কাছের জ্যোগায় দ্রুবিয়ে লাগিয়ে নিন। চিউবটির নিচের প্রান্তে আলভোভাবে চাপ দিন যেন এপ্লিকেটরাটি ৫ গ্রাম পূর্ণ ক্রীম ভর্তি হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এপ্লিকেটরাটি অবশ্যই ৫ গ্রাম পূর্ণ ভর্তি করে নিতে হবে।



২। পরিমাণমত ক্রীম নেওয়ার পরে এপ্লিকেটরাটি চিউব থেকে সরিয়ে নিন এবং দ্রুত ক্যাপ দ্বারা চিউবটি বৃক্ষ করুন।



৩। শায়িত হয়ে, হাত উঁচু করে এবং ছড়নো অবস্থায় থীরে থীরে এপ্লিকেটরাটি ভ্যাজাইনার গভীরে যতদূর সঙ্গে প্রবেশ করুন। পিস্টনটিকে চাপ দিয়ে সম্পূর্ণ ক্রীম ভর্তি রেখে প্রবেশ করুন, অতঃপর পিস্টনটিকে কোনোরূপ স্পর্শ ছাড়াই এপ্লিকেটরাটি বের করে আনুন।

প্রতিবার ব্যবহারের পরে এপ্লিকেটরাটি সাবান এবং হালকা গরম পানি দিয়ে ধূয়ে ফেলুন। ৫০° সে. এর চেয়ে অধিক গরম পানি অথবা দ্রাবক ব্যবহার করা যাবে না। অতঃপর এপ্লিকেটরাটি ধূঁয়ে দেবেন ও পাকেটে সংরক্ষণ করুন। ব্যবহারের পরে সর্বদা ধূঁয়ে সাবান এবং হালকা গরম পানি দিয়ে হাত ধোত করুন। ফেন্টিনক্স® ভিসি পিচিল নয় এবং খুব সহজেই পানি দিয়ে দুর্ব করা যায়।

প্রতিনির্দেশনা: ফেন্টিকোনাজল অথবা এটির যেকোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতায় ফেন্টিকোনাজল প্রতিনির্দেশিত।

প্রার্থনাক্রিয়া: ভ্যাজাইনার অভ্যন্তরে ব্যবহারের পরে কদাচিৎ ক্ষণস্থায়ী জ্বালাপোড়া হতে পারে, যা খুব শীত্রীয় নিরামায় হয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: যেহেতু গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন এটির ব্যবহারের কোন তথ্য নেই, সেহেতু ফেন্টিকোনাজল চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়।

সর্বকর্তা: জননিরোধক গুরুতরের সাথে ফেন্টিকোনাজল ব্যবহার করা উচিত নয়। ফেন্টিকোনাজলের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা অথবা এর বিরুদ্ধে জীবাণুর রেজিস্টেন্ট প্রমাণিত হলে চিকিৎসা বৃক্ষ করা উচিত এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

অন্য ওয়ার্দের সাথে প্রতিক্রিয়া: যেহেতু ভ্যাজাইনার ব্যবহারের পর ফেন্টিকোনাজলের সিস্টেমিক শোষণ খুবই কম তাই অন্য ওয়ার্দের সাথে প্রতিক্রিয়ার সভাবনা কর।

মাত্রাধিক্রিয়া: যেহেতু ভ্যাজাইনার ব্যবহারের পর সিস্টেমিক শোষণ খুবই কম, তাই মাত্রাধিক্রিয় হওয়ার সভাবনা খুবই কম।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫° সে. তাপমাত্রার নিচে এবং শুক হানে রাখুন।

উপচাপনা: ফেন্টিনক্স® ভিসি: প্রতিটি কার্টনে একটি ল্যামি চিউবে আছে ৩০ গ্রাম ভ্যাজাইনাল ক্রীম এপ্লিকেটরসহ।

০১  
০৯

  
Opsonin Pharma  
Ideas for healthcare

Manufactured by  
Opsonin Pharma Limited  
Rupatali, Barishal, Bangladesh  
® Registered Trade Mark