

Haloxa®

Halobetasol Propionate USP 0.05%

DESCRIPTION: Haloxa® (Halobetasol Propionate 0.05%) is a super potent corticosteroid which has anti-inflammatory, anti-pruritic and vasoconstrictive actions.

MODE OF ACTION: Halobetasol Propionate 0.05% is thought to act by the induction phospholipase A2 inhibitory proteins (collectively called lipocortins). It is postulated that these proteins control the biosynthesis of potent mediators of inflammation such as prostaglandins and leukotrienes by inhibiting the release of their common precursor, arachidonic acid.

COMPOSITION

Haloxa® Cream: Each gram cream contains Halobetasol Propionate USP 0.5 mg.

Haloxa® Ointment: Each gram ointment contains Halobetasol Propionate USP 0.5 mg.

INDICATION: Haloxa® is indicated for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of corticosteroid responsive dermatitis.

DOSAGE & ADMINISTRATION: Apply a thin layer of Haloxa® Cream or Ointment to the affected skin once or twice daily based on the severity of diseases as directed by the physician and rub in gently and completely. Haloxa® is a super potent corticosteroid; therefore, treatment should be limited to two weeks and amounts greater than 50 g/week should not be used. If no improvement is seen within 2 weeks, reassessment of the diagnosis may be necessary.

CONTRAINDICATION: Halobetasol Propionate 0.05% is contraindicated in those patients with a history of hypersensitivity to any of the components of the preparation.

SIDE EFFECTS: The following side effects have been reported infrequently with topical corticosteroids- burning, itching, irritation, dryness, folliculitis, acneiform eruptions, hypopigmentation, perioral dermatitis, allergic contact dermatitis, secondary infections, skin atrophy, striae and miliaria.

USE IN PREGNANCY & LACTATION: Halobetasol Propionate 0.05% should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus. It is not known whether topical administration of Halobetasol Propionate 0.05% could results in sufficient systemic absorption produce detectable quantities in breast milk.

PRECAUTIONS: Systemic absorption of topical corticosteroids may cause reversible Hypothalamic-Pituitary-Ad renal (HPA) axis suppression, manifestations of Cushing's syndrome, hyperglycemia and glycosuria. Patients receiving large dose of a potent topical steroid applied to a large surface area or under an occlusive dressing should be evaluated periodically for evidence of HPA axis suppression by using the urinary free cortisol and ACTH stimulation tests. If HPA axis suppression is noted, an attempt should be made to minimize this side effects.

INTERACTION: Medicine used on the skin is not likely to be affected by other drugs. Risk or severity of hyperglycemia can be increased when Halobetasol Propionate 0.05% is combined with 2, 4-thiazolidinedione & Acarbose. The risk or severity of hypertension can be increased when Halobetasol Propionate 0.05% is combined with Aldosterone.

OVERDOSE: High doses or long-term use of Halobetasol Propionate 0.05% topical can lead to thinning skin, easy bruising, changes in body fat (especially in face, neck, back and waist), increased acne or facial hair, menstrual problems, impotence or loss of interest in sex.

STORAGE: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25° C temperature and protected from light.

PACKAGING

Haloxa® Cream: Each carton has a tube containing 20 gm cream.

Haloxa® Ointment: Each carton has a tube containing 20 gm ointment.

01/07/2024

হ্যালোক্সা®

হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ইউএসপি ০.০৫%

বিবরণ: হ্যালোক্সা® (হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ০.০৫%) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী কর্টিকোস্টেরয়েড যার প্রদাহনশক্তি, চুলকানিনশক্তি এবং রক্তনালীর সংকেচন ধর্ম আছে।

কার্যপদ্ধতি: ধারণা করা হয় যে হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ফসফোলাইপেজ এ-২ ইনহিবিটরী প্রোটিন সমূহকে (সামগ্রিকভাবে লিপোকার্টিন বলা হয়) প্রভাবিত করে তার কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। লিপোকার্টিসমূহ এরাকিমিক এসিডের নিম্নরুপে বাধা প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদাহ সুষ্ঠিকরী উপাদানের যেমন-প্রোস্টাগ্লাউকনস, লিওক্রেট্রাইস্টেরোনের বায়েসিনথেসিস নিয়ন্ত্রণ করে।

উপাদান

হ্যালোক্সা® ক্রীম: প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ইউএসপি ০.৫ মিল্গ্রাম।

হ্যালোক্সা® অয়েটেমেট: প্রতি গ্রাম অয়েটেমেটে আছে হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ইউএসপি ০.৫ মিল্গ্রাম।

নির্দেশনা: হ্যালোক্সা® কর্টিকোস্টেরয়েড সংবেদনশীল ডার্মাটাইটিস-এর প্রদাহ নিরাময়ে ও এবং দ্বারা সৃষ্টি চুলকানি উপশমে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি: রোপের ব্যাপকতার উপর নির্ভর করে হ্যালোক্সা® ক্রীম বা অয়েটেমেট এর পাতলা প্রলেপে আত্মস্থ হনে দিনে ১-২ বার দিতে হবে। হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ০.০৫% একটি অধিক শক্তিশালী কর্টিকোস্টেরয়েড তাই ইহার ব্যবহার দুই সপ্তাহের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে এবং প্রতি সপ্তাহে ৫ গ্রামের অধিক মাত্রা ব্যবহার করা যাবে না। যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে রোপের নির্মমণ না হয় তাহলে পুনরায় রোগ পরিষ্কা করতে হবে।

বিকল ব্যবহার (মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ০.০৫% ঘৃন্দের প্রতি মেসব রোগীর অতিরিক্তব্যেনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে জ্বরী, চুলকানি, ইরিটেশন, অক্তা, ফলিবুলাইটিস, একনি, হাইপোগ্লামেটেশন, পেরিওডার্মাটাইটিস, স্প্রজনিত ত্বকে এলার্জি, সেকেভারী ইনফেকশন, চামড়ার ক্ষয়, স্ট্রাই এবং মিল্গ্রামারিয়া।

গৰ্ভবত্যায় ও স্ন্যাদনকালে ব্যবহার: কেবলমাত্র ফর্মের ক্ষতিকর প্রভাবের তেমনে মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা মৌলিক মনে হচ্ছে গৰ্ভবত্যায় হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ০.০৫% ব্যবহার করা যাবে। ক্ষীরীয় ব্যবহারের ফলে স্টেরয়েডওলের সিস্টেমিক শোষণের কারণে মায়ের দ্বারে নির্মাণের পরিমাণে এবং উপরিভিত্তিতে হয় কিন্তু তা এখনো জানা যায়নি।

সতর্কতা: ক্ষীরীয় কর্টিকোস্টেরয়েডের সিস্টেমিক পিট্রিটারী এজিনাল এক্রিস সাপ্রেশন, ক্রুশিং সিন্ড্রোম, হাইপারগ্লাইসেমিয়া এবং গুকোসুরিয়া হচ্ছে। মেসব রোগী অধিকতর মাত্রা অধিক জ্বাঙ্গজ্বৰে অধিক শক্তিশালী কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করে বা অক্সিত ড্রেসিংস ব্যবহার করে আসছে তাদের ইন্টেরিনারী ফ্রি কার্টিসল এবং এসিটিএচ স্টিলুলেশন টেস্টের মাধ্যমে এইচিপি এক্রিস সাপ্রেশনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। যদি এইচিপি এক্রিস সাপ্রেশন হয় সেকেতে প্রথমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমানোর জন্য ব্যবহারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

অন্য ঘৃন্দের সাথে প্রতিক্রিয়া: ত্বকে ব্যবহৃত ঘৃন্দ সাধারণত অন্য ঘৃন্দ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হাইপারগ্লাইসেমিয়া বেড়ে যেতে পারে যখন হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ০.০৫% ২-খারাজোজিডিনেট ও আ্যাকোরেজে এর সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয়। হাইপারটেনশন বেড়ে যেতে পারে যখন হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ০.০৫% আ্যাভেটেরেন এর সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয়।

মাঝারিক: অতিরিক্ত বা দীর্ঘমাত্র ধরে হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট টপিক্যাল ব্যবহার করালে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে যেমন- ত্বকে পাতলা হওয়া, ক্রুজিং, শরীরের ফ্যাটের পরিবর্তন (বিশেষত মুখে, ঘাড়ে, পিছনে, কোমরে), অতিরিক্ত ব্রণ বা ফেসিয়াল চুল, মেনস্ট্রুয়াল সমস্যা বা সহবাসে অনান্ন।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগাদের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫° সে. তাপমাত্রার নিচে ও শুষ্কভাবে রাখুন।

উপচাপনা

হ্যালোক্সা® ০.০৫% ক্রীম: প্রতি গ্রাম কার্টনে একটি টিউবে আছে ২০ গ্রাম ক্রীম।

হ্যালোক্সা® ০.০৫% অয়েটেমেট: প্রতি গ্রাম কার্টনে একটি টিউবে আছে ২০ গ্রাম অয়েটেমেট।



Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh
® Registered Trade Mark.