



Myo-inositol 550mg + D-chiro-inositol 150 mg

Composition:

Myochiro® Tablet: Each tablet contains Myo-inositol 550 mg and D-chiro-inositol 150 mg standardized extract.

Description:

D-chiro-inositol is a naturally occurring inositol isomer extracted by a patented process from Carob (Ceratonia siliqua) pod native to Southern Europe. The perfect combination of Myo-inositol and D-Chiro-inositol with a specific ratio may help to correct the hormonal imbalance and menstrual cycle to achieve ovulation. This combination significantly decreases the level of prolactin hormone, testosterone hormone, luteinizing hormone and also balances the ratio of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. It increases insulin sensitivity,

estrogen hormone level and reduces oxidative stress within the ovarian follicles. It helps in follicular development, improves egg quality, and restores ovulation in women to enhance the chances of pregnancy. It helps to prevent the onset of gestational diabetes mellitus. It also reduces symptoms associated with PCOS and improves fertility in women with PCOS.

Indications and Uses:

Myochiro® Tablet is indicated for the treatment and prevention of-

- Infertility
- Gestational diabetes mellitus
- Polycystic ovary syndrome (PCOS) associated symptoms such as menstrual irregularity, anovulation, hirsutism, acanthosis nigricans, acne, obesity and PCOS associated infertility
- Ovarian hyperstimulation syndrome
- Miscarriage

Dosage and Administration:

Orally 2 tablets daily or as advised by the physician.

Duration of Treatment:

Duration of treatment should be at least 3 months or as advised by the physician.

Contraindications:

Contraindicated in patients with known hypersensitivity to D-chiro-inositol and Myo-inositol.

Pregnancy and Lactation:

Several human studies have been conducted in pregnant women with D-chiro-inositol and Myo-inositol combination that show no clinically relevant adverse effects. There are no published clinical data on the safety of D-chiro-inositol and Myo-inositol during lactation.

Side Effects:

Generally well tolerated in the recommended

dose. Occasionally may occur nausea, diarrhea and flatulence.

Drug Interactions:

Concurrent use with digoxin may result in increased digoxin toxicity. Concomitant use of D-chiro-inositol and Myo-inositol may potentiate the effect of antidiabetic drugs.

Storage:

Do not store above 30°C. Protect from light and moisture. Keep out of reach of children.

Packs:

Myochiro Tablet: Each box contains 18 tablets in Alu-Alu blister pack.



Opsonin Herbal & Nutraceuticals

Gateway to Nature's Remedy

Manufactured by:
Opsonin Herbal & Nutraceuticals Limited
Barishal, Bangladesh.



মায়ো-ইনোসিটল ৫৫০ মিগ্রা এবং ডি-কায়ারো-ইনোসিটল ১৫০ মিগ্রা

উপাদান:

মায়োকায়ারো® ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে মায়ো-ইনোসিটল ৫৫০ মিগ্রা এবং ডি-কায়ারো-ইনোসিটল ১৫০ মিগ্রা এর স্ট্যাভার্ডাইজড নির্যাস।

বিবরণ:

ডি-কায়ারো-ইনোসিটল প্রাকৃতিক ভাবে লক ইনোসিটল আইসোমার, যা দক্ষিণ ইউরোপের ক্যারব (সেরাটোনিয়া সিলিকা) নামক উভিদের শুট থেকে একটি পেটেট প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্যাসকৃত। মায়ো-ইনোসিটল এবং ডি-কায়ারো-ইনোসিটল এর একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের এই কথিনেশনটি হরমোনের তারসাম্য বজায় রাখে এবং মাসিক চক্রকে নিয়মিত করার মাধ্যমে ডিফিলিংসরণে সহায়তা করে। এই কথিনেশনটি প্রোল্যাক্টিন হরমোন, টেস্টোস্টেরন হরমোন, লুটিনাইজিং হরমোনের মাত্রা ত্বাস করে এবং এছাড়াও ফলিকুল-স্টিমুলেটিং হরমোন এবং লুটিনাইজিং হরমোনের অনুপাতের ভারসাম্য বজায় রাখে। এটি তিমকোমের ইনসুলিনের প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি, ইস্টেক্রোজেন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি এবং অ্যান্ডেটিভ স্টেরেস ত্বাস করে। এই কথিনেশনটি ডিমকোমের বিকাশ, শুগারতামান বৃদ্ধি এবং ডিফিলিংসরণে সহায়তা করার মাধ্যমে গর্ভাধারণের সম্ভাবনা বাড়াতে সহায় করে। এটি গর্ভকালীন সময়ে ডায়াবেটিসের

বুকি প্রতিরোধ করতে সহায় করে। এছাড়াও এটি পিসিওএস এর সাথে সম্পর্কিত উপসর্গগুলো ত্বাস করে এবং যে সকল মহিলা পিসিওএস এর সমস্যায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে গর্ভাধারণে সহায়তা করে।

নির্দেশনা ও ব্যবহার:

মায়োকায়ারো® ট্যাবলেট যে সকল রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে নির্দেশিত-

• বন্ধ্যাত্ম

• গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

• পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম (পিসিওএস) এর কারণজনিত লক্ষণসমূহ যেমন- অনিয়মিত মাসিক, অ্যানোভুলেশন বা ডিমিনিশন না হওয়া, মুখে অস্থাভাবিক লোহের আধিক্য, তুকের বিভিন্ন অংশে যেমন ঘাড়, কপাল ও অন্যান্য ছানে বাদামি থেকে কালো দাগ হওয়া, ব্রণ, ওজন বৃদ্ধি এবং পিসিওএস এ সংশ্লিষ্ট বন্ধ্যাত্ম

• ওভারিয়ান হাইপারাস্টিমুলেশন সিন্ড্রোম

• গর্ভগত

সেবনমাত্রা ও সেবনবিধি:

প্রতিদিন ২টি করে ট্যাবলেট সেব্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দেশিত।

সেবনের ছিত্কাল:

সেবনের ছিত্কাল কমপক্ষে ৩ মাস অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দেশিত।

প্রতিনির্দেশনা:

যে সকল রোগীদের ডি-কায়ারো-ইনোসিটল এবং মায়ো-ইনোসিটল এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

গর্ভবত্য ও স্তন্যাদানকালে ব্যবহার:

গর্ভবত্য মহিলাদের ক্ষেত্রে ডি-কায়ারো-ইনোসিটল এবং মায়ো-ইনোসিটলের কমিশনেশন এর উপর সংগঠিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। স্তন্যাদানকালে ডি-কায়ারো-ইনোসিটল এবং মায়ো-ইনোসিটলের কথিনেশন গ্রহণ নিরাপদ এমন কোন তথ্য প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পাওয়া যায়নি।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

নির্দেশিত মাত্রায় ডি-কায়ারো-ইনোসিটল এবং মায়ো-ইনোসিটল শরীরের জন্য সহমশীল। কদাচিং বমি বমি ভাব, ডায়ারিয়া এবং পেট ফাঁপা জানিত জাটিলতা দেখা যেতে পারে।

অন্য ওষধের সাথে ত্বাস:

ডিগ্রিনের সাথে সহব্যবহারের ক্ষেত্রে ডিগ্রিনের বিষক্রিয়া বৃদ্ধি পেতে পারে। ডি-কায়ারো-ইনোসিটল এবং মায়ো-ইনোসিটলের

হারবাল ঔষধ

সাথে সহব্যবহারে এন্টি ডায়াবেটিক জাতীয় ওষধের কার্যকারিতা ত্বাসিত হতে পারে।

সংরক্ষণ:

৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপর সংরক্ষণ করা থেকে বিরত থাকুন। আলো এবং আদ্রিতা থেকে দূরে রাখুন।

সকল ওষধ শিশুদের মাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ:

মায়োকায়ারো® ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে রয়েছে অ্যালু-অ্যালু প্রিস্টার প্যাকে ১৮ টি ট্যাবলেট।



Opsonin Herbal & Nutraceuticals

Gateway to Nature's Remedy

প্রস্তুতকারক:

অপসোনিন হারবাল এন্ড নিউট্রিপিটিক্যালস লিমিটেড
বরিশাল, বাংলাদেশ।