

Slyrin® Jelly

Glycerol BP 11.25%

Description: Glycerol is a sterile semi-solid preparation used for personal & surgical lubrication.

Mode of action: Glycerol reduces the friction between two surfaces and facilitates smooth movement.

Pharmacokinetics: No systemic absorption or effect is achieved.

Composition

Slyrin® Jelly: Each gm jelly contains Glycerol BP 112.5 mg.

Indications: Helps lubricating in sexual intercourse especially for post-menopausal women to reduce irritation, for lubrication during ultrasound procedure.

Dosage & administration: Apply as required.

Contraindications: Usually well-tolerated. People with prior history of sensitivity or allergic reaction to this product or any of its ingredients should not use it.

Side effects: Stop using the topical emollient and call your doctor if there is severe burning, stinging, redness, or irritation where the product was applied.

Use in pregnancy & lactation: No adequate data on pregnancy and lactation. Precaution should be taken in case of pregnant or breast-feeding.

Precautions: Only for external use. When using this product do not get into eyes.

Drug interactions: It is not likely that other drugs take orally or inject will have an effect on topically applied products. But many drugs can interact with each other. Do not start a new medication without the permission of doctor.

Over dosage: Over dose through topical administration is not known and not likely.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25°C temperature and protected from light.

Packaging

Slyrin® Jelly: Each tube pack contains 50 gm Glycerol Jelly.

স্লাইরিন® জেল

গ্লিসারল বিপি

বিবরণ: গ্লিসারল একটি সেমি-সলিড প্রিপারেশন যা প্যারসোনাল লুট্রিক্যান্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কার্যপ্রক্রিয়া: গ্লিসারল দুটি আলাদা সারফেসের মধ্যে ফ্রিকশন কমায় এবং স্বাভাবিক গতি ভুলাবিত করে।

ওয়েবের উপর শরীরের ক্রিয়া (ফার্মাকোকাইনেটিক্স): এর কোন সিসটেমিক প্রয়োগ নেই।

উপাদান

প্রতি গ্রাম জেলিতে রয়েছে গ্লিসারল বিপি ১১২.৫ মিগ্রা।

নির্দেশনা: ইহা যৌন মিলনের সময় বিশেষ করে মেনোপজ প্রবর্তী মহিলাদের পর্যাপ্ত পিছিলতার অভাবে অবস্থিতিক যৌন মিলনে পিছিলকারক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও আলট্রাসাউন্ড পরাইক্ষার সময় পিছিলকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাত্রা ও ধরণ: ধরণেজনমত ব্যবহার করুন।

বিরুদ্ধ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): এটি সাধারণত সুসংহৃদীয়। তবে এর যে কোন উপাদানের প্রতি স্পর্শকাতরতা বা এ্যালারজিক রিএকশনের পূর্বে অভিজ্ঞতা থাকলে ব্যবহার থেকে বিরুত থাকুন।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: ব্যবহারের পর যন্ত্রণাদায়ক জ্বালাপোড়া বা লালচেতাব দেখা দিলে অতিসত্ত্ব চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: পর্যাপ্ত ডাটা নেই। স্তন্যদানকালে সাবধানতা অবস্থান করতে হবে।

সতর্কতা: ইহা শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য। ব্যবহারের সময় চোখের সংস্পর্শে যেন না আসে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

অন্য ওয়েবের সাথে প্রতিক্রিয়া: বাহ্যিকভাবে ব্যবহারের ফলে এর প্রভাব পড়বে এমন নয়। কিন্তু অনেক ওষুধ আছে যা একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যাপ্তীত ওষুধ ব্যবহার করা অনুচিত।

মাত্রাধিক্য: বাহ্যিকভাবে মাত্রাধিক ব্যবহারবিধি জ্বালা যায় নি।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আমে থেকে দূরে, ২৫°C সে. তাপমাত্রার নিচে এবং শুক্রান্তে রাখুন।

উপস্থাপনা

স্লাইরিন® জেল: প্রতি কার্টনে একটি টিউবে আছে ৫০ গ্রাম জেল।


Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.