

Xyloken®

Lidocaine USP

Description

Xyloken® (Lidocaine) is a local anesthetic

Mode of action

Xyloken® (Lidocaine) acts mainly by inhibiting sodium influx through sodium specific ion channels in the neuronal cell membrane, in particular voltage-gated sodium channels. When the influx of sodium is interrupted, an action potential cannot arise and signal conduction is inhibited. The receptor site is thought to be located at the cytoplasmic (inner) portion of the sodium channel. Lidocaine binds more readily to sodium channels in activated state, thus onset of neuronal blockade is faster in neurons that are rapidly firing. This is referred to as state dependent blockade.

Pharmacokinetics

Lidocaine is absorbed following topical administration to mucous membranes, its rate and extent of absorption being dependent upon the concentration and total dose administered, the specific site of application and duration of exposure.

Lidocaine is metabolised rapidly by the liver. The metabolites and unchanged drug are excreted by the kidneys.

Composition

Xyloken® Spray: Each metered dose spray delivers Lidocaine USP 10 mg.

Indications

Xyloken® is a topical anesthetic used for the following purposes-

- To help prevent pain associated with minor surgical procedures in the ear, nose and throat
- To help prevent pain and or discomfort during dental procedures (e.g. prior to an injection, dental impressions, X-ray photography, removal of calculus)

- During general anesthesia to prevent coughing
- To help prevent pain during the final stages of childbirth, before the cutting or stitching of the perineum (skin between the vagina and anus)

Xyloken® spray is also used to reduce pain or discomfort caused by skin irritations such as sunburn, insect bite, minor cut or stitching, scratch, burn and circumcision.

Xyloken® spray is also used to treat Premature Ejaculation and to prolong sexual intercourse.

Dosage & administration

Adult: Each spray delivers 10 mg of Lidocaine. The maximum dose is 20 sprays (200 mg).

- In dentistry, the normal dose is 1-5 sprays. Two sprays per quarter of the mouth are recommended, with a maximum of 3 sprays per quarter of the mouth over 30 minutes.


- In sinus procedures, 3 sprays are used.
- In procedures of the throat and windpipe (Introduction of instruments, tubes and catheters), up to 20 sprays may be necessary.

- During delivery, Up to 20 sprays may be necessary.

Skin Irritations & Pain: 1-2 sprays (highest 20 sprays) may be necessary.

Premature Ejaculation: Apply 1 spray (highest 2 sprays) of Xyloken to the glans (top surface) of penis and leave for 5-10 minutes then wipe off (not required for condom user) then drive for intercourse.

Children: In children less than 12 years of age the



dose should not exceed 3 mg/kg (e.g. 6 metered doses for 20 kg infant). When used mainly in the larynx and trachea the dose should be reduced to 1.5 mg/kg. In children <3 years of age less concentrated lidocaine solutions are recommended.

Contraindications

Should not be given to patients with myasthenia gravis, epilepsy, impaired cardiac condition or liver damage.

Side effects

Skin rash or irritation, drowsiness, wheezing or difficulty breathing, chest pain, severe rash or itching, increased sweating, numbness.

Use in pregnancy & lactation

Pregnancy category B. It can be given to a pregnant woman as per doctor's judgment. Small amount of Lidocaine may pass to a lactating baby, but the amount is insignificant to cause any harm.

Precautions

Patient should be careful driving or operating machinery after use of Lidocaine 10% Spray. Patient may be drowsy and reflexes may be slow. Patient should not eat or drink anything for at least 1 hour after using Lidocaine 10% Spray in the mouth or throat area. Should be careful not to spray Lidocaine 10% Spray near the eyes. If any of the spray does go in the eye, should rinse immediately with lots of water for at least 15 minutes and should seek doctor's attention.

Drug interactions

Lidocaine should be used with caution in patients receiving agents structurally related to local anaesthetics, e.g. antiarrhythmics such as mexiletine and tocainide.

Drugs that reduce the clearance of lidocaine (e.g. cimetidine or betablockers) may cause potentially toxic plasma concentrations when lidocaine is given in repeated high doses over a long time period.

Over dosage

The first signs that too much Lidocaine 10% Spray has been used usually take the form of light-headedness, drowsiness, dizziness and sometimes blurred vision. In the event of serious overdosage trembling, seizures or unconsciousness may occur.

Storage

Store in a cool and dry place, protected from light.

Packaging

Xyloken® 100 Spray: Each carton contains a bottle of 10 ml solution (100 spray).

Xyloken® 500 Spray: Each carton contains a glass bottle of 50 ml solution (500 spray), a nozzle sprayer and an additional sprayer.



Opsonin
Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.

জাইলোকেন®

লিডোকেইন ইউএসপি

বিবরণ

জাইলোকেন® (লিডোকেইন) একটি লোকাল চেতনানাশক।

কার্যপদ্ধতি

জাইলোকেন® (লিডোকেইন) স্লায়কোমের আবরণাতে অবস্থিত ভোক্টেজ-গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল দিয়ে সেডিভামের কোষাভাস্তুর প্রেশ বন্ধ করে। ফলে আক্ষেন প্লেটেনশিয়াল স্থাপিত হয় না এবং বাতা বহন বন্ধ হয়ে যায়। সক্রিয় অবস্থার সেডিভাম চ্যানেলগুলোতে লিডোকেইন দেশি সংজ্ঞ স্থাপিত হয়; তাই যেসব স্মার্থকের দ্রুত উত্তোলিত হয়, এসব ক্ষেত্রে স্মার্থবার্তার তুলনামূলক তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়। এই ব্যাপারটিকে অবস্থানির্ভর রাকেড বলা হয়।

গুরুত্বের উপর শরীরের ক্রিয়া (ফার্মাকোকাইনেটিক্স)

লিডোকেইন স্লায়কোমের প্রতিক বিপ্লব থেকে শোষিত হয়। এর শোষনের হার ও পরিমাণ নির্ভর করে এর মাত্রা ও মোট প্রয়োগকৃত মাত্রা, প্রয়োগের নির্দিষ্ট অঙ্গে ও স্থানের যথাব্যবস্থার উপর।

লিডোকেইন যন্ত্র দ্রুত দ্বারা প্রয়োক হয়। মেটোবোলাইটসমূহ এবং অপরিবর্তিত প্রযুক্ত বন্ধ হয়ে নিঃস্পৃত হয়।

উপাদান

জাইলোকেন® স্প্রে: প্রতি মিটারড ডোজ স্প্রে সরবরাহ করে লিডোকেইন ইউএসপি ১০ মিল।

নির্দেশনা

টপিকাল চেতনানাশকরী হিসেবে জাইলোকেন® (লিডোকেইন) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়-

- মানক, কান ও গলার ছেট ছেট অঞ্চলগারের সময় ব্যাথোরোধ ক্ষেত্রে
- দাঁতের চিকিৎসার সময় ব্যাথা বা অবস্থি প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে।
- কেন্দ্রীয় চেতনানাশের সময় কাশি প্রতিক্রিয়া করতে
- বাতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দ্বারা প্রেরিত ব্যাথা বোধ করতে পারে।

জাইলোকেন® স্প্রে হ্রকে আলাপোড়া যেমন-রোদে পোড়া, পোকামাকড়ের কামড়, ছেট কাটা বা সেলাই, আঁচড়ের দাগ ও হৃতকের পোড়াজিনিত ব্যাথা বা অবস্থি ক্ষেত্রে এবং স্মৃদ্ধ ব্যন্দার ব্যাথা ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়।

জাইলোকেন® স্প্রে দ্রুত বীর্ঘ্যপথের চিকিৎসার এবং দৈরিক মিলন আরও সীর্বারিত করতেও ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও ধারণ

গুরুত্বের

প্রতি স্প্রে ১০ মিল লিডোকেইন সরবরাহ করে। সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে ২০টি স্প্রে (২০০ মিল।)

- দাঁতের ক্ষেত্রে ব্যাথিক মাত্রা হচ্ছে ১-৫ স্প্রে। মুখের প্রতি কোষাট্টারে ২টি করে স্প্রে দিতে হবে। ৩০ মিলিট সময়ে সর্বোচ্চ তিনি স্প্রে দেয়া যাবে।

- সামান্যের প্রস্তাবিতে তিনি স্প্রে দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

- গলা ও বায়নালীর (পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, টিটুব ও ক্যার্যেটোরসমূহ) ক্ষেত্রে ২০টি স্প্রে প্রয়োজন হতে পারে।

- অ্বসরকালীন সময়ে ২০ টি পর্যন্ত স্প্রে প্রয়োজন হতে পারে।

হৃতকের আলাপোড়া যেমন-রোদে পোড়া, পোকামাকড়ের কামড়, ছেট কাটা, আঁচড়ের দাগ ও হৃতকের পোড়াজিনিত ব্যাথা বা অবস্থি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

দ্রুত বীর্ঘ্যপথের চিকিৎসার এবং দৈরিক মিলন আরও সীর্বারিত করতেও ব্যবহার করতে হবে। এরপর নরম কাপড় অবস্থানে রয়েল করে ৫-১০ মিলিট অবশেষ করতে হবে।

অ্বসরকালীন সময়ে রয়েল করে ৫-১০ মিলিট অবশেষ করতে হবে।

নজল স্প্রেয়ার

৫০ মিলি সলিউশনের জন্য

বিভিন্ন প্রকার সর্জিক্যাল প্রস্তুতির যেমন- কান, নাক, গলা, দাঁত ইত্যাদি-এর স্মৃদ্ধ অপারেশনের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

স্প্রেয়ার

হৃতকের আলাপোড়া যেমন-রোদে পোড়া, পোকামাকড়ের কামড়, ছেট কাটা, আঁচড়ের দাগ ও হৃতকের পোড়াজিনিত ব্যাথা বা অবস্থি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

বা টিন্যু পেপার দিয়ে মুছে (কন্ডম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরাসরি) দৈরিক মিলনে যাওয়া যাবে।

শিখ: ১২ বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে ৩ মিলি/কেজি এর বেশি দেয়া যাবে না।

(যেমন ২০ কেজি শিশুর জন্য ৬টি মিটারড ডোজ স্প্রে)। স্বর্ণমুক্ত ও ট্রাকিয়াতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাত্রা হবে ১.৫ মিলি/কেজি। ৩ বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে ক্ষম মাত্রার লিডোকেইন ব্যবহার করতে হবে।

বিবরণ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না) যেসব ক্ষেত্রের মাঝামাঝি প্রেসিস, মৃগীরোগ, অতিপূর্ণ হৃদপিণ্ড বা যক্তের ক্ষেত্রে ক্ষম হয়ে আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পর্যাপ্তিক্রিয়া ত্বকে চুলকান, বিমুনি, শ্বাস-প্রশ্বাসে কঠিন, বুকে ব্যাথা, মারাত্মক চুলকান, বেশি ঘাস ইত্যাদি এবং অনুভূতিহীনতা।

গৰ্ভবত্ব ও স্বন্দানকামে ব্যবহার প্রেসিসক ব্যবহার ক্ষেত্রে ক্ষম হয়ে আছে। চিকিৎসকের নির্দেশমত গৰ্ভবত্ব মহিলাদের দেয়া যাবে। মাতৃদুষ্কে লিডোক