

Timodor® Sterile Eye Drops

Dorzolamide 2% + Timolol 0.5%

Description: Dorzolamide is a carbonic anhydrase inhibitor and Timolol is a beta-adrenergic receptor blocking agent.

Mode of Action: Dorzolamide inhibits carbonic anhydrase II and Timolol blocks beta adrenergic receptor in the ciliary processes of the eye that decreases aqueous humor secretion.

Composition: Timodor® Sterile Eye Drops: Each ml contains Dorzolamide Hydrochloride BP 22.26 mg equivalent to Dorzolamide 20 mg and Timolol Maleate BP 6.83 mg equivalent to Timolol 5 mg.

Preservative: Preservative Free.

Indication: Open angle glaucoma or ocular hypertension.

Dosage & Administration: One drop in the affected eye(s) twice daily or as directed by the physician.

Contraindication: Contraindicated in patients who are hypersensitive to Dorzolamide and Timolol or any of the components of this preparation.

Side Effects: The most frequently adverse reactions may be taste perversion (bitter, sour, or unusual taste) or ocular burning and/or stinging in up to 30% of patients. Conjunctival hyperemia, blurred vision, superficial punctate keratitis or eye itching may be reported between 5-15% of patients.

Use in Pregnancy & Lactation: Pregnancy Category C. It is not known whether Dorzolamide is excreted or not in human milk but Timolol may excrete in human milk following topical ocular administration. This medicine should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

Precaution: External use only. If solution changes color or becomes cloudy, do not use.


Drug Interactions: No data found.

Overdose: No data found.


Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25° C temperature and protected from light. Do not freeze. Do not touch dropper tip to any surface since this may contaminate this solution. Do not use after two months of first opening.

Packaging: Timodor® Sterile Eye Drops: Each OSD bottle contains 5 ml sterile eye drops.

Application Process



1. Pull off the tamper-evident seal
2. Remove the cap of the bottle
3. Tilt the bottle and keep it for few times



4. Squeeze the bottle gently to apply the drops to the eye as needed by dropping one drop at a time
5. After use, recap the bottle and store it for further use

Opsonin
Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh
® Registered Trade Mark.

টিমোডোর® জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস

ডরজোলামাইড ২% + টিমোলল ০.৫%

বিবরণ: ডরজোলামাইড একটি কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর এবং টিমোলল একটি বিটা অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টর ব্লকিং এজেন্ট।

কার্যপদ্ধতি: ডরজোলামাইড কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ II-কে বাধা দেয় এবং টিমোলল চোখের সিলিয়ারি প্রসেস এর বিটা অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টরকে ব্লক করে, যা অ্যাকুয়াস হিউমার এর নিঃসরণ হ্রাস করে।

উপাদান: টিমোডোর® জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতি মিলিতে রয়েছে ডরজোলামাইড হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ২২.২৬ মিগ্রা যা ডরজোলামাইড ২০ মিগ্রার সমতুল্য এবং টিমোলল ম্যালিয়েট বিপি ৬.৮৩ মিগ্রা যা টিমোলল ৫ মিগ্রার সমতুল্য।

প্রিজারভেটিভ: প্রিজারভেটিভ মুক্ত।

নির্দেশনা: ওপেন-এঙ্গেল গ্লaucoma বা অকুলার হাইপারটেনশন।

মাত্রা ও প্রয়োগ: আক্রান্ত চোখে ১ ফোঁটা করে দিনে ২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহার্য।

বিরুদ্ধ ব্যবহার: ডরজোলামাইড এবং টিমোলল এর কোন উপাদান এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: সবচেয়ে বেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্বাদ বিকৃতি (তিক্ত, টক, বা অস্বাভাবিক স্বাদ), চোখের জ্বালা এবং খচখচে ভাব অনুভূত হয়, যা ৩০% রোগীর ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। ৫-১৫% রোগীদের মধ্যে কনজাংকটিভাল হাইপারেমিয়া, ঝাঁপসা দৃষ্টি, সুপারফিসিয়াল পাংকটেট ক্যারাইটিস বা চোখের চুলকানি দেখা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি সি। মাতৃদুগ্ধে ডরজোলামাইড নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি; কিন্তু টিমোলল মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হতে পারে। ভ্রূণের সম্ভাব্য ক্ষতির তুলনায় গর্ভবতী মায়ের সম্ভাব্য উপকারিতা বিবেচনা করে ব্যবহার করা উচিত।

সতর্কতা: শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য। যদি দ্রবণ এর রঙ পরিবর্তন বা ঘোলা হয়ে যায়, তাহলে ব্যবহার করা উচিত নয়।


অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

মাত্রাধিক্য: কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।


সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫° সে. তাপমাত্রায় এবং শুষ্ক স্থানে রাখুন। রেফ্রিজারেটরে রাখবেন না। ড্রপার-এর উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না, কারণ তা দ্রবণকে দূষিত করতে পারে। প্রথম খোলার দুই মাস পর ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

উপস্থাপনা: টিমোডোর® জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতিটি ওএসডি বোতলে রয়েছে ৫ মিলি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস।

প্রয়োগপদ্ধতি



১. টেম্পার এভিডেন্ট সীলটি খুল ফেলুন
২. বোতলের ক্যাপ অপসারণ করুন
৩. বোতলটি কাত করে কিছুক্ষণ ধরে রাখুন



৪. বোতলে হালকা চাপ দিয়ে এক ফোঁটা করে প্রয়োজনমতো ড্রপ চোখে ব্যবহার করুন
৫. বোতলের ক্যাপ লাগিয়ে পরবর্তী ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করুন

Opsonin
Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh
® Registered Trade Mark.

0942-01