

Queta®

Quetiapine

Description: Queta® (Quetiapine Fumarate) is an atypical antipsychotic agent. It works at multiple neurotransmitter receptors in the brain & used in the treatment of Schizophrenia, Bipolar disorder etc.

Mode of Action: The mode of action of Quetiapine is unknown. However, it has been proposed that this drug's efficacy in schizophrenia is mediated through a combination of dopamine D2 receptor antagonism in the mesolimbic pathway and serotonin 5HT2A receptor antagonism frontal cortex. In bipolar depression and major depression, Quetiapine's actions may be attributed to the binding of this drug or its metabolite to the norepinephrine transporter. Quetiapine's agonism of serotonin 5HT1A may relieve anxiety & depression, antagonism of histamine H1 receptors may explain the somnolence and that of adrenergic α1 receptors may explain the orthostatic hypotension observed with this drug.

Composition: Queta® 25 mg Tablet: Each film coated tablet contains Quetiapine Fumarate USP 28.780 mg equivalent to Quetiapine 25 mg.

Queta® XR 50 mg Tablet: Each extended release tablet contains Quetiapine Fumarate USP 57.560 mg equivalent to Quetiapine 50 mg.

Queta® 100 mg Tablet: Each film coated tablet contains Quetiapine Fumarate USP 115.120 mg equivalent to Quetiapine 100 mg.

Queta® XR 200 mg Tablet: Each extended release tablet contains Quetiapine Fumarate USP 230.240 mg equivalent to Quetiapine 200 mg.

Queta® XR 300 mg Tablet: Each extended release tablet contains Quetiapine Fumarate USP 345.360 mg equivalent to Quetiapine 300 mg.

Indications: ◆ Schizophrenia ◆ Bipolar Disorder ◆ Depressive disorder.

Dosage & administration: Recommended dosing for Quetiapine: Quetiapine can be taken with or without food.

Bipolar Mania: As monotherapy or as adjunct therapy with other anti-psychotic drugs.

| | |
|-------|-----------------------------|
| Day 1 | 50 mg in two divided doses |
| Day 2 | 100 mg in two divided doses |
| Day 3 | 150 mg in two divided doses |
| Day 4 | 200 mg in two divided doses |
| Day 5 | 300 mg in two divided doses |
| Day 6 | 400 mg in two divided doses |

Data indicates that the majority of patients responded between 400 to 800 mg/day. The safety of doses above 800 mg/day has not been evaluated in clinical trials.

Schizophrenia

Usual Dose: Quetiapine should generally be administered with an initial dose of 25 mg bid, with increments of 25-50 mg bid or tid on the second and third day, as tolerated, to a target dose range of 300 to 400 mg daily by the fourth day, given bid or tid. Further dosage adjustments, if indicated, should generally occur at intervals of not less than 2 days, as steady-state for Quetiapine would not be achieved for approximately 1-2 days in the typical patient. When dosage adjustments are necessary, dose increments/decrements of 25-50 mg bid are recommended. Most efficacy data with Quetiapine were obtained using tid regimens, but in one controlled trial 225 mg bid was also effective.

Overdosage: In human, experience with Quetiapine in acute overdosage was limited with estimated doses ranging from 1200 mg to 9600 mg and no fatalities were reported. In general, reported signs and symptoms were drowsiness and sedation, tachycardia and hypotension. In case of acute overdosage, ensure adequate oxygenation and ventilation. Close medical supervision with cardiovascular monitoring should continue until the patient recovers.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25° C temperature and protected from light.

Packaging: Queta® 25 mg Tablet: Each carton contains 14X5 tablets in blister pack.

Queta® XR 50 mg Tablet: Each carton contains 10X5 tablets in blister pack.

Queta® 100 mg Tablet: Each carton contains 21X3 tablets in blister pack.

Queta® XR 200 mg Tablet: Each carton contains 10X3 tablets in blister pack.

Queta® XR 300 mg Tablet: Each carton contains 10X2 tablets in blister pack.

| Indication | Initial dose and titration | Recommended dose |
|--|--|------------------|
| Depressive Episodes Associated with Bipolar Disorder | Day 1: 50 mg/day; Day 2: 100 mg/day; Day 3: 200 mg/day; Day 4: 300 mg/day | 300 mg/day |
| Major Depressive Disorder, Adjunctive Therapy with Antidepressants | Day 1 & 2: 50 mg/day Day 3 & 4: 150 mg/day | 150-300 mg/day |

Geriatric Use:

Consider a lower starting dose (50 mg/day), slower titration and careful monitoring during the initial dosing period in elderly.

Heaptic Impairment:

Lower starting dose (50 mg/day) and slower titration may be needed.

Contraindications: Quetiapine is contraindicated in patients with known hypersensitivity to active ingredient or any component of the product.

Side effects: Common side effects of Quetiapine are dry mouth, constipation, dyspepsia, tachycardia, hypertension, elevated plasma-triglyceride and cholesterol concentration, peripheral edema, drowsiness, headache, irritability, asthenia, leucopenia, neutropenia, blurred vision, rhinitis.

Use in pregnancy & Lactation: USFDA category C. There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women and Quetiapine should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

Nursing Mothers: It is recommended that women receiving Quetiapine should not breast-feed.

Use in children: The safety and effectiveness of Quetiapine in pediatric patients less than 13 years with Schizophrenia, less than 10 years with bipolar mania and less than 18 years for bipolar depression have not been established.

Precautions: Quetiapine should be used with caution in patients with cardiovascular disease and cerebrovascular disease, seizures, tardive dyskinesia and neuroleptic malignant syndrome. In such an event dose reduction or discontinuation of Quetiapine should be considered.

Drug Interactions: Quetiapine should be used with caution in combination with other centrally acting drugs and alcohol. Co-administration of Quetiapine with phenytoin, thioridazine and carbamazepine increases clearance of Quetiapine. Co-administration with potent CYP3A4 inhibitors such as azole antifungals and macrolide antibiotics increases plasma concentration of Quetiapine. Quetiapine may antagonize the effects of levodopa and dopamine agonists.

Overdosage: In human, experience with Quetiapine in acute overdosage was limited with estimated doses ranging from 1200 mg to 9600 mg and no fatalities were reported. In general, reported signs and symptoms were drowsiness and sedation, tachycardia and hypotension. In case of acute overdosage, ensure adequate oxygenation and ventilation. Close medical supervision with cardiovascular monitoring should continue until the patient recovers.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25° C temperature and protected from light.

Packaging: Queta® 25 mg Tablet: Each carton contains 14X5 tablets in blister pack.

Queta® XR 50 mg Tablet: Each carton contains 10X5 tablets in blister pack.

Queta® 100 mg Tablet: Each carton contains 21X3 tablets in blister pack.

Queta® XR 200 mg Tablet: Each carton contains 10X3 tablets in blister pack.

Queta® XR 300 mg Tablet: Each carton contains 10X2 tablets in blister pack.

947-1



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh
® Registered Trade Mark.

কুয়েটা®

কুইটায়াপিন

বিবরণ: কুয়েটা® (কুইটায়াপিন ফিউটারেট) একটি এটিপিক্যাল এন্টিসাইকোটিক। এটি মাঝিকের বিভিন্ন নিউরোট্রিপ্সিটার রিসেপ্টরের উপর কাজ করে এবং সিজোফ্রেনিয়া, বাইপলের ডিজার্ভের সহিত রিসেপ্টরের সাথে সহায়তা করে।

কার্যপদ্ধতি: কুইটায়াপিনের কার্যপদ্ধতি জানা যায়নি ধারণা করা হয়, কুইটায়াপিন মাঝিকের মাসেলিহিক পথওয়ে-এবং ড্রেনেজ রিসেপ্টরে এবং ফ্লুটাল কর্টেরে সেন্সোরিন (৫-এচটি-২-এ) রিসেপ্টরের বাধা প্রদানের মাধ্যমে সিজোফ্রেনিয়া নিরাময় করে, নরপিণিয়েলিন ট্রাল্পিপোর্টারের উপর কাজ করা রাম্বামে বাইপলের রেগোল সমস্যার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এ ছাড়া কুইটায়াপিন (৫-এচটি-১-এ) রিসেপ্টরের সহিত সংজ্ঞায় করা হয়ে আছে এটিপিনজিমের ফলে ঘূর্ণ ঘূর্ণ ভাবের এবং এক্স্রেজিভ অ্যালফা-১ রিসেপ্টরের এন্টিগোলিজেনের ফলে অর্থস্টেটিক হাইপোটেনশনের দেখা যায়।

উপায়ন: কুয়েটা® ২৫ মিয়া ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে কুইটায়াপিন ফিউটারেট ইউএসপি ২৮.৭৮০ যা কুইটায়াপিন ২৫ মিয়া এর সমতুল্য।

কুয়েটা® এক্স্রার ৫০ মিয়া ট্যাবলেট: প্রতিটি এক্স্রেজিভ রিসিলজ ট্যাবলেটে রয়েছে কুইটায়াপিন ফিউটারেট ইউএসপি ৫৭.৬০ যা কুইটায়াপিন ৫০ মিয়া এর সমতুল্য।

কুয়েটা® ১০০ মিয়া ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে কুইটায়াপিন ফিউটারেট ইউএসপি ১১৫.১২০ যা কুইটায়াপিন ১০০ মিয়া এর সমতুল্য।

কুয়েটা® এক্স্রার ২০০ মিয়া ট্যাবলেট: প্রতিটি এক্স্রেজিভ রিসিলজ ট্যাবলেটে রয়েছে কুইটায়াপিন ফিউটারেট ইউএসপি ২৩০.২৪০ যা কুইটায়াপিন ২০০ মিয়া এর সমতুল্য।

কুয়েটা® এক্স্রার ৩০০ মিয়া ট্যাবলেট: প্রতিটি এক্স্রেজিভ রিসিলজ ট্যাবলেটে রয়েছে কুইটায়াপিন ফিউটারেট ইউএসপি ৩৪৫.৩৬০ যা কুইটায়াপিন ৩০০ মিয়া এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: ◆ সিজোফ্রেনিয়া ◆ বাইপলের ডিসেপ্টার্ভার শিপ্রেসিভ ডিসেপ্টার্ভার সাথে।

মাত্রা ও প্রয়োগ:

কুয়েটা® প্রতিদিন সেবনমাত্রা: কুইটায়াপিন আহারের পর অথবা খালি পেটে সেবন করা যায়।

বাইপলের মানিয়া: এককমাত্রা বা সহায়ক মাত্রা হিসেবে অন্য এন্টিসাইকোটিক ওয়ার্দের সাথে ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিক্রিয়া: কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করে এমন ঘূর্ণ এবং এলকেপেনের সাথে এর সমকালীন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কুইটায়াপিন, থার্মোরিভেন্স অথবা কার্বামাজাপিন এর সাথে ব্যবহার করলে কুইটায়াপিন এর নির্মাণের পরিমাণ ঘূর্ণ পায়। শিক্কিমালী CYP3A4 প্রতিবন্ধক (যেমন: ছাত্রক নাশক ও মায়াক্রোলাইট এন্টিরায়োটিক) এর সাথে কুইটায়াপিন এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া যায়। কুইটায়াপিন সিলভেটা এবং ডোপামিন এগনিন্ট এর আহারের ক্ষেত্রে কুইটায়াপিন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন দেয়।

মার্জিবিক: ১২০০ মিয়া থেকে ১৬০০ মিয়া পর্যন্ত ভোজে তীব্র উচ্চ মাত্রায় সংক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে কুইটায়াপিন চিকিৎসা ১০ বছরের নিচে ব্যবহার করতে হবে।

ব্যবহার করে থাকা পর্যন্ত কুইটায়াপিন এর রোগীদের চিকিৎসা ১৮ বছরের নিচে কুইটায়াপিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও কার্যকরিতা কোন উপর কে ব্যাপ্ত পাওয়া যাবে।

সতর্কতা: হৃৎপিণ্ড ও মাঝিকের রক্ষণসংবর্ধনত সংক্রান্ত রোগ, সিজো, টার্নিভিড ডিজাইনেসিয়া ও নিউরোলেপ্টিক মায়ালিগন্যান্ট সিলভেট সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

অন্য ঘূর্ণের সাথে প্রতিক্রিয়া: কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করে এমন ঘূর্ণ এবং এলকেপেনের সাথে এর সমকালীন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কুইটায়াপিন, থার্মোরিভেন্স অথবা কার্বামাজাপিন এর সাথে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।