

Povin® Eye Drops

Povidone 5%

Description

Povin® is a sterile ophthalmic solution containing Povidone (polymer) with electrolytes (inorganic salts) for topical administration to the eyes.

Composition

Povin® Eye Drops: Each ml Sterile eye drops contains Povidone BP 50 mg.

Indications

Povidone is used for the symptomatic treatment of dry eye conditions including keratoconjunctivitis sicca. It is also given as a substitute of tear fluid in case of unstable tear film or insufficient moistening of the eye surface.

Dosage & administration

1 drop 4 times daily or as required, depending upon the severity of the disease, to be instilled into the conjunctival sac.

Contraindications

This eye drop is contraindicated in patients with known hypersensitivity to any ingredient of the product.

Side effects

Occasionally mild, transient burning or sticky sensation and very rarely irritation or hypersensitivity reactions reported. Blurred vision after application may occur.

Use in pregnancy & lactation

There is no experience regarding the safety of the Povidone eye drops in human pregnancy or lactation. Administration during pregnancy and lactation is therefore not recommended, except for compelling reasons.

Precautions

Patients, who experience blurred vision after application of the eye drops, should not drive or use machinery until their vision has cleared. Contact lenses should not be worn during instillation of the drug. After instillation, there should be an interval of at least 30 minutes before reinsertion.

Drug interactions

If several medicines are to be administered to the eye, there should be an interval of at least 5 minutes between each application.

Over dosage

Not known and not likely about over dose.

Storage

Store bellow 25°C. Do not freeze. Store in cool and dry place, protected from light. Keep out of the reach of children. Do not touch dropper tip to any surface as this may contaminate this preparation. Do not use after one month of first opening.

Packaging

Povin® Eye Drops: Each dropper bottle contains 10 ml sterile eye drops.

পভিন® চোখের ড্রপস

পোভিডোন ৫%

বিবরণ

পভিন® হলো পোভিডোন (পলিমার) এবং ইলেক্ট্রোলাইটস্‌ (ইন্অরগানিক সল্ট) এর সমন্বয়ে গঠিত চোখে ব্যবহার উপযোগী দ্রবণ।

উপাদান

পভিন® চোখের ড্রপস: চোখে ব্যবহার উপযোগী প্রতি মিলি জীবাণুমুক্ত দ্রবণে রয়েছে পোভিডোন বিপিসি ৫০ মিগ্রা।

নির্দেশনা

ক্যারাটোকেনজাংকটিভাইটিস সিক্সাহ চোখের উপরিভাগে শুক্তার লক্ষণমিত চিকিৎসায় পোভিডোন নির্দেশিত। চোখের অস্থিতিশীল অশ্রু বিকল্প হিসেবে এবং চোখের উপরিভাগের আর্দ্রতা কমে গেলেও পোভিডোন ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ধরণ

কনজাংকেটিভাল সেকেণ্ড ১ ফেঁটা করে দিনে চার বার অথবা রোগের অবস্থা বৃুৰো প্রয়োগ করা যায়।

বিরুদ্ধ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না)

ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে দ্রবণটি প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

হালকা এবং অল্প জ্বালাপোড়া অথবা চটচটে অনুভূত হতে পারে। অল্প ক্ষেত্রে অস্থিতি এবং সংবেদনশীলতা লক্ষ করা যায়। প্রয়োগের পর দৃঢ়ি বাপসা হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় ও তন্যদানকালীন সময়ে পোভিডোনের নিরাপত্তা সংকেত কোন তথ্য নেই। তাই একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত গর্ভাবস্থায় ও তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সতর্কতা

ব্যবহারের পর যদি দৃঢ়ির অস্পষ্টতা অনুভূত হয় তাহলে গাঢ়ি অথবা কোন প্রকার যান্ত্রিক কাজ করা উচিত নয়। ওষুধ প্রয়োগের সময় কন্টেন্ট লেস ব্যবহার করা ঠিক নয়। ওষুধ প্রয়োগের আধা ঘন্টা পর চোখের কন্টেন্ট লেস ব্যবহার করা যেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

যদি বিভিন্ন ওষুধ একসাথে প্রয়োগ করতে হয় তাহলে প্রতিটি ওষুধ প্রয়োগের মাঝখানে কমপক্ষে পাঁচ মিনিটের বিরতি রাখা উচিত।

মাত্রাধিক্রিয়া

মাত্রাধিক্রিয়ের ব্যাপারে জানা যায়নি এবং ঘটেনি।

সংরক্ষণ

২৫°C. এর নিচে সংরক্ষণ করুন। রেফ্রিজারেটরে রাখবেন না। আলো থেকে দূরে ঠাঁকা ও শুক স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগাদের বাইরে রাখুন। ড্রপারের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না, কারণ তা সাসপেনশনকে দূষিত করতে পারে। ড্রপারের মুখ খোলার একমাস পর ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

উপস্থিতি

পভিন® চোখের ড্রপস: প্রতিটি ড্রপার বোতলে আছে জীবাণুমুক্ত ১০ মিলি চোখের ড্রপস।



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.