

Crezyme® Pro

Pancreatin

Description: Crezyme® Pro is a preparation of mammalian pancreas containing enzyme protease, lipase and amylase.

Composition:

Crezyme® Pro Capsule: Each capsule contains Pancreatin BP 325 mg as enteric coated pellets.

Indications:

Children: Reduced or absence of pancreatic exocrine secretion.
-Cystic fibrosis.
Adults: In the conditions with deficient pancreatic exocrine function such as
-Following pancreatectomy
-Following total gastrectomy
-Chronic pancreatitis

Dosage and Administration: 1-3 capsules daily with meal or as per direction of the physician.

Contraindication: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients present in this drug.

Side Effects: Pancreatin may cause buccal and perianal soreness, particularly in infants. Hypersensitivity reactions may include sneezing, lacrimation and skin rashes

Precautions: Pancreatin should be used with caution in patients known to be allergic to animal protein.

Use in Pregnancy and Lactation:

Pregnancy: For pancreatic enzymes no data on exposed pregnancies are available. Caution should be exercised when prescribing to pregnant women.

Lactation: Pancreatic enzymes can be used during breastfeeding, if required during pregnancy and lactation, Pancreatin should be used in doses sufficient to provide adequate nutritional status.

Overdose: Extremely high doses of Pancreatin may cause diarrhoea or other transient intestinal upset.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry place, below 25° C temperature and protected from light.

Packaging:

Crezyme® Pro Capsule: Each carton contains 6X15 capsule in Alu-Alu blister pack.

ক্রিজাইম® প্রো

প্যানক্রিয়োটিন

বিবরণ: ক্রিজাইম® প্রো স্ট্যাপায়ী প্রাণীদের প্যানক্রিয়াস থেকে প্রাপ্ত এনজাইম যা প্রোটিয়েজ, লাইপেজ ও অ্যামাইলোজ-এর সমষ্টিয়ে গঠিত।

উপাদান:

ক্রিজাইম® প্রো ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে প্যানক্রিয়োটিন বিপি ৩২৫ মিগ্রা এন্টারিক কোটেড পিলেটস্।

নির্দেশনা:

শিশু: যাদের প্যানক্রিয়োটিক এন্ডোক্রিনের নিঃসরণ হ্রাস বা অনুপস্থিত থাকে এবং সিস্টিক ফাইব্রোসিস।

প্রাণী বয়সের ক্ষেত্রে: অঞ্চ্যাশয় এক্রোক্রাইনের নিঃসরণ হ্রাস পেলে

◆ প্যানক্রিয়োটেকটোমির পর

◆ সম্পূর্ণ গ্যাস্টেকটোমির পর

◆ দীর্ঘব্যায়ী প্যানক্রিয়াটাইটিস এর ক্ষেত্রে

মাত্রা ও প্রয়োগ: প্রতিদিন খাবারের সাথে ১-৩টি ক্যাপসুল অথবা চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুসারী সেবা।

বিকৃক্ত ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): প্যানক্রিয়োটিন বা প্যানক্রিয়োটন-এ ব্যবহৃত যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা।

পর্যাপ্তত্বক্রিয়া: প্যানক্রিয়োটিন ব্যবহারে শিশুদের ক্ষেত্রে মুখবিহুর বা মালদ্বারের পাশে ব্যথা হতে পারে। হাঁচি, চোখ থেকে পানি বারা এবং তুক ফাটার মত সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে।

সতর্কতা: প্যানক্রিয়োটিন প্রাণীজ প্রোটিনে যাদের সংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

গর্ভবত্তায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার:

গর্ভবত্তায়: অঞ্চ্যাশয় এনজাইমগুলির জন্য গর্ভবত্তার কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

গর্ভবত্তায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

স্তন্যদানকালে: স্তন্যদানের সময় অঞ্চ্যাশয় এনজাইমগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

গর্ভবত্তা এবং স্তন্যদানের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টির প্রয়োজন হলে প্যানক্রিয়োটিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাত্রাবিক্রিয়া: অত্যধিক ডোজ ডায়ারিয়া বা অন্যান্য ক্ষণঘায়ী অঙ্গের বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ২৫° সে. তাপমাত্রার নিচে এবং শুষ্কস্থানে রাখুন।

উপস্থাপনা: ক্রিজাইম® প্রো ক্যাপসুল: প্রতিটি কার্টনে আছে ৬×১৫ ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু রিস্টার প্যাক।



Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh



Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh