

Opsonin Pharma Limited

Insert Design of Opatin DS Mono

Version: 01, Raised on : 20.08.26, Last Correction : 06.09.26

Color : 02, Paper Type: Art paper 120 gsm Indonesia (), Measurement : Length-150 X Height-225 mm

Opatin[®] DS Sterile Eye Drops

Olopatadine USP 0.2%
(Preservative-free Single Vial)

Description: Olopatadine Hydrochloride is a relatively selective H1 receptor antagonist and mast cell stabilizer for topical administration to the eyes.


Mode of action: Olopatadine selectively blocks histamine H1 receptor and stabilizes mast cells. Thus it prevents histamine bonding to its receptors and inhibits mast cell degranulation & histamine release.

Composition: Opatin[®] DS Mono Preservative-free Sterile Eye Drops: Each ml contains Olopatadine Hydrochloride USP 2.22 mg equivalent to Olopatadine 2 mg.

Indications: Olopatadine is indicated for the treatment of ocular itching associated with allergic conjunctivitis.

Dosage & administration: Adults and children: One drop in each affected eye once a day.

Administration guidelines:



Contraindications: It is contraindicated in persons with a known hypersensitivity to any component of this product.

Side effects: Headache, blurred vision, burning or stinging, cold syndrome, foreign body sensation, hyperaemia, nausea and pharyngitis.

Use in pregnancy & lactation: Pregnancy category C. There is no adequate and well controlled studies in pregnant women. Therefore, this drug should be used in pregnant women only if the potential benefit to the mother justifies the potential risk to the embryo or fetus. It is not known if this medicine passes into breast milk, therefore it is not recommended for use during breastfeeding.

Precautions: Patients should be advised not to wear contact lenses during treatment with Olopatadine ophthalmic solution. The treatment should also be discontinued in the presence of an allergic reaction.

Drug interactions: Specific drug interaction studies have not been conducted with Olopatadine ophthalmic solution.

Over dosage: No case of overdose has been reported.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry, well ventilated place at temperature up to 30°C and protected from extraneous odors, contamination & intense light. Do not touch the dropper tip to surfaces since this may contaminate the solution.

Packaging

Opatin[®] DS Mono Preservative-free Sterile Eye Drops: Each carton contains 2X15 vials in Alu-Alu sachet pack. Each single vial contains 0.4 ml of sterile eye drops.



Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.

অপাটিন® ডিএস মনো জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস

অলোপ্যাটাডিন ইউএসপি ০.২%
(প্রিজারভেটিভ-মুক্ত সিঙ্গেল ডোজ)

বিবরণ: অলোপ্যাটাডিন হাইড্রোক্লোরাইড একটি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস, যা তুলনামূলকভাবে সিলেকটিভ এইচ১ রিসেপ্টর বিরোধী এবং মাস্টসেল স্ট্যাবিলাইজার এবং শুধুমাত্র চোখে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত।

কার্যপদ্ধতি: অলোপ্যাটাডিন হিষ্টামিন এইচ১ রিসেপ্টর প্রতিরোধক এবং মাস্ট সেল স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে কাজ করে। এভাবে অলোপ্যাটাডিন হিষ্টামিনকে এর রিসেপ্টরে সংযুক্ত হতে বাধা দেয় এবং মাস্ট সেল ডিগ্র্যানুলেশন ও হিষ্টামিন নিঃসরণে বাধা প্রদান করে।

উপাদান: অপাটিন® ডিএস মনো প্রিজারভেটিভ-ফ্রি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: চোখে ব্যবহার উপযোগী প্রতি মিলি জীবাণুমুক্ত দ্রবণে আছে অলোপ্যাটাডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ২.২২ মিগ্রা যা ২ মিগ্রা অলোপ্যাটাডিন এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: অলোপ্যাটাডিন চোখের চুলকানি এবং অ্যালার্জিক কনজাংকটিভাইটিস এ নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগ: প্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশুদের ক্ষেত্রে: ১ ফোঁটা করে দিনে ১ বার আক্রান্ত চোখে প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবহারবিধি:



বিরুদ্ধ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): অলোপ্যাটাডিন হাইড্রোক্লোরাইড বা এ ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: মাথাব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি, চোখ জ্বালাপোড়া, কোন্ড সিনড্রম, হাইপারেমিয়া, বমি বমি ভাব, ফ্যারিঞ্জাইটিস দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থার পর্যায়-সি। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ ও সুনিয়ন্ত্রিত গবেষণা করা হয়নি। যদি প্রণের সময়সীমা চেয়ে গর্ভবতী মায়ের উপকার বেশি হয় সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। স্তন্যদানকালে ব্যবহার: মাতৃদুগ্ধে অলোপ্যাটাডিন নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি। তবে স্তন্যদানকালে অলোপ্যাটাডিন ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

সতর্কতা: অলোপ্যাটাডিন এর চিকিৎসাকালীন সময়ে রোগীদের কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি কোন অ্যালার্জিক বিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তাহলে চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়া উচিত।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: চোখের দ্রবণ হিসেবে অলোপ্যাটাডিন এর নির্দিষ্ট কোন ওষুধ আন্তঃক্রিয়া প্রমাণিত হয়নি।

মাত্রাধিক্য: মাত্রাধিক্যের ব্যাপারে জানা যায়নি এবং ঘটেনি।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। শুষ্ক ও পর্যাপ্ত বায়ুচলাচলযুক্ত স্থানে ৩০°সে. পর্যন্ত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন এবং বাহ্যিক স্রাব, দূষণ ও তীব্র আলো থেকে দূরে রাখুন। ড্রপারের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না কারণ তা সল্যুশনকে দূষিত করতে পারে।

উপস্থাপনা

অপাটিন® ডিএস মনো প্রিজারভেটিভ-ফ্রি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস: প্রতিটি কার্টনে রয়েছে ২x১৫ টি ডোজ অ্যালু-অ্যালু স্যাশে প্যাকেটে। প্রতিটি সিঙ্গেল ডোজে আছে ০.৪ মিলি জীবাণুমুক্ত চোখের ড্রপস।

Opsonin
Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
© Registered Trade Mark.

000-001