

Triovent®

Beclomethasone Dipropionate BP + Formoterol Fumarate Dihydrate BP + Glycopyrronium

Description: Beclomethasone Dipropionate is a steroid, Formoterol Fumarate is a long-acting selective beta₂-adrenergic agonist (LABA) and Glycopyrronium Bromide is a long-acting Muscarinic Antagonist (LAMA).

Mode of action: Beclomethasone Dipropionate is a steroid which reduces airway inflammation. Formoterol Fumarate is a long acting selective beta₂ adrenergic agonist that acts as a bronchodilator in the lungs. Glycopyrronium Bromide is a long-acting Muscarinic Antagonist that prevents Bronchoconstriction and mucus production.

Composition: Triovent® 100 Metered Dose Inhaler: Each actuation delivers Beclomethasone Dipropionate BP 100 mcg, Formoterol Fumarate BP 6 mcg and Glycopyrronium Bromide BP 12.5 mcg equivalent to Glycopyrronium 10 mcg.

Triovent® 200 Metered Dose Inhaler: Each actuation delivers Beclomethasone Dipropionate BP 200 mcg, Formoterol Fumarate BP 6 mcg and Glycopyrronium Bromide BP 12.5 mcg equivalent to Glycopyrronium 10 mcg.

Indications: Maintenance treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).

Dosage & administration: Adults (18 years and older): 2 inhalations twice daily (morning and evening, approximately 12 hours apart).

Contraindications: This Metered Dose Inhaler is contraindicated in patients with hypersensitivity to Beclomethasone, Glycopyrronium, formoterol fumarate, or to any component of the product.

Side effects: Dry mouth, Cough, Muscle spasms, Nausea and vomiting, Headache etc.

Use in pregnancy & lactation: Pregnancy Category C. There is no adequate and well-controlled trials of Beclomethasone Dipropionate, Formoterol Fumarate and Glycopyrronium in pregnant women. It is not known whether this drug excreted in human milk or not.

Precautions: Combination of Beclomethasone, Glycopyrronium and formoterol fumarate Metered Dose Inhaler should not be initiated in patients with acutely deteriorating COPD, which may be a life-threatening condition.

Drug interactions: Xanthine derivatives, Steroids, Diuretic, Monoamine oxidase inhibitors, Tricyclic antidepressants, Beta-blockers, others Adrenergic agonist and others Muscarinic antagonist.

Overdosage: Over dose may causes nausea, vomiting, dizziness, lightheadedness, blurred vision, intraocular pressure, seizures, angina, hypertension or hypotension, tachycardia, nervousness, headache, tremor, palpitations, muscle cramps, sleep disturbances, metabolic acidosis, hyperglycemia, hypokalemia.

Storage: Keep out of reach of children. Store in a dry, well ventilated place at temperature up to 30°C and protected from extraneous odors, contamination & intense light.

Packaging: Triovent® 100 Metered Dose Inhaler: Each canister contains 120 Metered Dose Inhalation.

Triovent® 200 Metered Dose Inhaler: Each canister contains 120 Metered Dose Inhalation.

ট্রায়োভেন্ট®

বেকলোমেথাসন ডাইপ্রোপিওনেট বিপি + ফরমোটেরেল ফিউমারেট ডাইহাইড্রেট
বিপি + গ্লাইকোপাইরোনিয়াম

বিবরণ: বেকলোমেথাসন ডাইপ্রোপিওনেট একটি স্টেরয়েড, ফরমোটেরেল ফিউমারেট একটি দীর্ঘ-কার্যকরী বিটা₂-অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিষ্ট (LABA) এবং গ্লাইকোপাইরোনিয়াম ব্রোমাইড একটি মাসকারিনিক অ্যান্টাগোনিষ্ট (LAMA)।

কার্যপদ্ধতি: বেকলোমেথাসন ডাইপ্রোপিওনেট একটি স্টেরয়েড যা শ্বাসনালীর প্রদাহ কমায়। ফরমোটেরেল ফিউমারেট একটি দীর্ঘ-কার্যকরী নির্দিষ্ট বিটা₂ অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিষ্ট যা ফুসফুসে ব্রঙ্কোডাইলেটর হিসেবে কাজ করে। গ্লাইকোপাইরোনিয়াম ব্রোমাইড যা ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন প্রতিরোধ করে এবং শ্বেদা উৎপাদন বন্ধ করে।

উপাদান: ট্রায়োভেন্ট® ১০০ মিটারড ডোজ ইনহেলার: প্রতিটি চাপীয় নিঃসরণে আছে বেকলোমেথাসন ডাইপ্রোপিওনেট বিপি ১০০ মাইক্রোগ্রাম, ফরমোটেরেল ফিউমারেট ডাইহাইড্রেট বিপি ৬ মাইক্রোগ্রাম ও গ্লাইকোপাইরোনিয়াম ব্রোমাইড বিপি ১২.৫ মাইক্রোগ্রাম যা গ্লাইকোপাইরোনিয়াম ১০ মাইক্রোগ্রাম এর সমতুল্য।
ট্রায়োভেন্ট® ২০০ মিটারড ডোজ ইনহেলার: প্রতিটি চাপীয় নিঃসরণে আছে বেকলোমেথাসন ডাইপ্রোপিওনেট বিপি ২০০ মাইক্রোগ্রাম, ফরমোটেরেল ফিউমারেট ডাইহাইড্রেট বিপি ৬ মাইক্রোগ্রাম ও গ্লাইকোপাইরোনিয়াম ব্রোমাইড বিপি ১২.৫ মাইক্রোগ্রাম যা গ্লাইকোপাইরোনিয়াম ১০ মাইক্রোগ্রাম এর সমতুল্য।

নির্দেশনা: দীর্ঘ মেয়াদি অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি)-এর মেনেন্টেন্যান্স চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগ: প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর এবং তার বেশি): দিনে দুবার ২ ইনহেলেশন (সকাল এবং সন্ধ্যা, ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে)।

বিকল্প ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না): এই মিটারড ডোজ ইনহেলারটি বেকলোমেথাসন ডাইপ্রোপিওনেট, ফরমোটেরেল ফিউমারেট ডাইহাইড্রেট ও গ্লাইকোপাইরোনিয়াম অথবা এর যেকোনো উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলত রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: শুষ্ক মুখ, কাশি, পেশীতে টান, বমি বমি ভাব এবং বমি, মাথাব্যথা।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় সি শ্রেণীর অর্ন্তগত। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে বেকলোমেথাসন ডাইপ্রোপিওনেট ফরমোটেরেল ফিউমারেট এবং গ্লাইকোপাইরোনিয়ামের পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত কোনও পরীক্ষা নেই। এই গুণ্যধর্মিতার মায়ের দুধে নির্গত হয় কিনা তা জানা যায় নি।

সতর্কতা: বেকলোমেথাসন ডাইপ্রোপিওনেট, ফরমোটেরেল ফিউমারেট ডাইহাইড্রেট ও গ্লাইকোপাইরোনিয়াম এর সমন্বয়ের মিটারড ডোজ ইনহেলারের সংমিশ্রণ সিওপিডির তীব্র অবনতিশীল রোগীদের ক্ষেত্রে শুরু করা উচিত নয়, যা একটি জীবন-হুমকিস্বরূপ অবস্থা হতে পারে।

অন্য গুণ্যধর্মের সাথে প্রতিক্রিয়া: জ্যাকুইন ডেরিভেটিভস, স্টেরয়েড, ডায়ুরেটিক, মনোঅ্যামিন অক্সিডেস ইনহিবিটর, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস, বিটা-ব্লকার এবং অন্যান্য অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগোনিষ্ট, মাসকারিনিক অ্যান্টাগোনিষ্ট।

মাত্রাধিকার: মাত্রাধিকার ব্যবহারে বমি-বমি ভাব, বমি, মাথা ঘোরা, মাথা হালকা লাগা, বাপসা দৃষ্টি, চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ, শিঁচুনি, বুক ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ অথবা নিম্ন রক্তচাপ, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, স্নায়বিক অস্থিরতা, মাথাব্যথা, কাঁপুনি, বুক ধড়-ধড় করা, পেশীতে শিঁচুনি, ঘুমের ব্যাঘাত, বিপাকীয় অ্যাসিডোসিস, রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি, পটাশিয়ামের মাত্রা হ্রাস।

সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। শুষ্ক ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে ৩০°C-এ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন এবং বাহ্যিক হ্রাণ, দূষণ ও তীব্র আলো থেকে দূরে রাখুন।

উপস্থাপনা: ট্রায়োভেন্ট® ১০০ মিটারড ডোজ ইনহেলার: প্রতিটি ক্যানিস্টারে রয়েছে ১২০ মিটারড ডোজ ইনহেলেশন।

ট্রায়োভেন্ট® ২০০ মিটারড ডোজ ইনহেলার: প্রতিটি ক্যানিস্টারে রয়েছে ১২০ মিটারড ডোজ ইনহেলেশন।


Opsonin Pharma
Ideas for healthcare

Manufactured by
Opsonin Pharma Limited
Rupatali, Barishal, Bangladesh.
® Registered Trade Mark.

000001

ইনহেলার ব্যবহারের নিয়মাবলী-


১

চিত্রের মত তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের মধ্যে ইনহেলারটি ধরে ৩ থেকে ৪ বার ঝাঁকিয়ে নিতে হবে।



২

এ্যাকচুয়েটরের মাউথপিস থেকে ক্যাপটি সরিয়ে নিন।




৩

মুখ দিয়ে ধীরে-ধীরে বাতাস বের করে আপনার ফুসফুসটি খালি করে নিন।




৪

ইনহেলারটিকে মুখের মধ্যে রাখতে হবে। ইনহেলারের নিঃসরণদ্বার মুখের মধ্যে দাঁতের ফাকে স্থাপন করুন এবং ঠোঁট দিয়ে ফাকা জায়গা বন্ধ করে নিন।




৫

মুখ দিয়ে ধীরে-ধীরে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে এবং একই সময়ে ক্যানিস্টারটিকে চাপ দিতে হবে। এভাবে ধীরে-ধীরে গভীরভাবে শ্বাস নেয়ার সময় একটি মাত্রা নিতে হবে।



৬

শ্বাস ধরে রাখতে হবে। ইনহেলারটিকে মুখ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ১০ সেকেন্ড অথবা যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস ধরে রাখতে হবে। অতঃপর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে হবে।



বিশেষ দৃষ্টব্য


- যদি একাধিক মাত্রা গ্রহণের দরকার হয় তবে কমপক্ষে ১ মিনিট অপেক্ষা করে ৩ থেকে ৬ নং ধাপ পুনরাবৃত্তি করুন।
- ইনহেলার ব্যবহারের পর কুলি করে মুখ পরিষ্কার করে নিন।

ইনহেলার পরিষ্কার করার নিয়ম

ক্যাপ ও এ্যাকচুয়েটর পরিষ্কার রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধাতব ক্যানিস্টার থেকে এ্যাকচুয়েটরটা খুলে হালকা গরম পানিতে সপ্তাহে কমপক্ষে একবার ধুয়ে নিতে হবে এবং বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে। ইনহেলার ঠিকমত পরিষ্কার করা না হলে এটা দিয়ে ঠিক মত স্প্রে করা যাবে না।

সতর্কতা

- চাপযুক্ত ক্যানিস্টার, আপাত দৃষ্টিতে খালি মনে হলেও ছিদ্র করা, ভাঙ্গা অথবা পোড়ানো যাবে না
- সরাসরি সূর্যালোক বা তাপ থেকে দূরে রাখুন
- ৩০° সে. এর নিচে সংরক্ষণ করুন
- চোখের সংস্পর্শে আসতে দেয়া যাবে না
- শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন



শিশুদের ব্যবহারের জন্য পিতা মাতার সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে। যাদের হাতে শক্তি কম তাদের ক্ষেত্রে এক হাতে চাপ প্রয়োগ করতে সমস্যা হতে পারে। তারা চাপ প্রয়োগের জন্য দুই হাত ব্যবহার করতে পারেন।

Parts of an Inhaler (ইনহেলারের অংশ সমূহ)

